


61
224

КРАТКОЕ ОПИСАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ,


которыя
весьма часто приключаются
ВЪ АРМІЯХЪ,
купно
съ правилами
какъ оныя врачевать должно.

Сочиненное
Г. Фанъ Свишеномъ,
а на Россійской языкъ
переведенное
Медицины Докторомъ
Мартыномъ Тереховскимъ.



Цѣна 30 коп.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,
при Императорской Академіи Наукъ
1778 года.



ПРЕДИСЛОВІЕ

отъ АВТОРА.

Состояніе воинской жизни обыкновенно подвержено бываетъ многоразличнымъ безпокойствамъ, бѣдствіямъ и неудобствамъ, которыя, будучи нераздѣльно сопряжены съ нею, изнуряя и крѣпкаго сложенія людей, часто великую гибель наносятъ. И потому нѣтъ ни малой причины удивляться, когда мы въ арміи великое число больныхъ видимъ.

Извѣстно же въ прочемъ изъ примѣчаній, что болѣзни, которыя случаются между войсками, не весьма до великаго числа простираются.

Для того я за благо разсудилъ, всѣ оныя болѣзни здѣсь включить, и описать всякую изъ нихъ порознь, представляя во первыхъ достовѣрные знаки, по которымъ одну отъ другой различить можно, потомъ присовокупляя припадки, которыя напряженіе или послабленіе болѣзни знаменуютъ, на конецъ упоминая именно приличныя лѣкарства и лищу, которыми врачеваться должно.

И такъ явствуетъ, что сочиняя малую такового содержанія книжицу, должно стараться

ПРЕДИСЛОВІЕ.

ратся быть кратку, да такъ, чтобы не быть при томъ темну и непонятну.

Вѣдаю, что врачи, которые искусство свое разумѣютъ и ежедневно оное въ дѣйство употребляютъ, никакой нужды въ сихъ моихъ первоначальныхъ правилахъ и простомъ наставленіи не имѣютъ.

Но часто столь много больныхъ въ арміи случается, и при томъ иногда въ толь разныхъ мѣстахъ находятся, что быть при всѣхъ врачамъ и подавать каждому изъ нихъ помощь отнюдь не возможно.

Въ таковомъ случаѣ необходимая нужда заставляетъ повѣрять больныхъ такимъ людямъ, отъ которыхъ не можно взыскивать довольнонаго знанія, какое искусные врачи имѣть должны.

Въ пользу таковыхъ единственно людей сія книжица сочинена, чтобы они роды болѣзней по знакамъ обстоятельно въ ней описаннымъ узнавать могли, и вѣдали бы какое при томъ воздержаніе въ лицѣ наблюдать, и какія лѣкарства употреблять должно.

Для лучшаго имѣ наставленія на концѣ приложены еще рецелты, и каждой изъ нихъ означенъ числомъ особливымъ, которое въ описаніи болѣзней упомянуто. Они сочинены, сколько возможно было, просто, такъ,

ПРЕДИСЛОВІЕ.

такъ, что и нужныя къ лѣкарственному составу вещи приискать весьма удобно можно, и самой составъ здѣлать не трудно будетъ.

Прежде нежели приступлю къ самому дѣлу, за полезное также почитаю, предложить здѣсь нѣкоторыя средства, которыми можно предѣлать болѣзни и сохранить здравіе военнослужащихъ. Правда не безъизвѣстно, что война не всегда дозволяетъ слѣдовать таковымъ предписаніямъ; однако при всемъ томъ полезно оныя вѣдать, чтобы по крайней мѣрѣ наблюдать оныя въ случаѣ, сколько обстоятельства дозволятъ.

I. Крестьянинъ принятый въ рекруты, и разлученный внезапно отъ сродниковъ, не вдругъ забываетъ свою деревню, но часто воображая ее въ своей мысли, скучаетъ, тужитъ и впадаетъ въ задумчивость; и такъ хотя онъ въ крестьянствѣ былъ здоровый и сильный мужикъ, но въ салдатахъ дѣлается немощнымъ, слабымъ, и трудовъ воинской службы понести не могущимъ. Для того желать должно, чтобы военачальники приобучали таковыхъ людей къ новому роду жизни мало по малу съ кротостію и снисхожденіемъ, и старались бы между тѣмъ сыскивать всякія

ПРЕДИСЛОВІЕ.

средства, которыя въ состояніи нечувствительно искоренять прежнее изъ мысли.

II. Всякія огородныя травы и свѣжіе плоды, также свѣжіе садовые овощи для пищи солдатамъ полезны, и никогда не вредятъ, развѣ неумѣренно употреблены будутъ; при томъ предохраняютъ отъ цынготной болѣзни и исцѣляютъ тѣхъ, которые оную уже имѣютъ: напротивъ того употребленіе неслѣбыхъ плодовъ весьма великой вредъ наноситъ.

III. Самая природа насъ учитъ, что должно избирать для питья воду самую чистую и свѣтлую, если только сыскать можно. Правда совершенно чистой воды найти не возможно: однако всегда должно предпочесть ту, которая меньше инородныхъ частицъ въ себѣ имѣетъ. Довольно въ прочемъ можно разпознавать степени чистоты слѣдующимъ образомъ: почерпнуть воды въ стекляной сосудъ, и влустить туда нѣсколько капель разлуценнаго влагою виннаго камня (*olei tartari per deliquium*). Если послѣ того вода здѣлается тотчасъ мутна; то она много примѣсу въ себѣ имѣетъ: если же здѣлается только маленькое облако, то она чище. Когда случится употреблять воду рѣчную; то не надобно оной черпать возлѣ берега: ибо вода по срединѣ

ПРЕДИСЛОВІЕ.

среди́нь теку́щая всегда́ здоро́вѣ бываетъ.

Случается иногда, что солдаты за недостаткомъ хорошей воды принуждены бываютъ пить худую. Въ такомъ печальномъ случаѣ должно мѣшать въ воду известное количество уксусу. На примѣръ если воды три фунта будетъ, то довольно уксусу полфунта. Чрезъ что и вода гораздо исправляется, и питье приятнѣе бываетъ.

Еще худая вода не столько вредительною здѣлаться можетъ, если вбросить въ нее нѣсколько кусочковъ корня ирь называемаго (*salatus aromaticus*). Сей корень вездѣ рождается, а особливо въ болотистыхъ мѣстахъ, гдѣ обыкновенно воды весьма вредительны бываютъ.

IV. Мундиръ надлежитъ давать солдатамъ доброй, который отъ стужи довольно защититъ можетъ. Салоги и башмаки для нихъ дѣлать надобно изъ крѣпкой кожи, и велѣть оныя нарочно шить дратвами намазанными лобольше смолою, или еще и всѣ швы оною намазать, чтобы тѣмъ меньше воды въ себя пролуцали.

V. Мѣсто для лагеря избирать надобно сколько возможно сухое. Земля, которая по видимому кажется быть сухою, не всегда самымъ дѣломъ такою бываетъ; если вода не въ великомъ разстояніи отъ

ПРЕДИСЛОВІЕ.

поверхности оной находится будетъ. Чтобы о семъ удостовѣриться точно: то стоитъ только вырыть яму, или еще лучше посмотрѣть колодязи въ близлежащихъ деревняхъ. Если вода въ колодязяхъ стоитъ высоко; то изъ того заключать можно, что то мѣсто мокрое: если же они глубоки, то явствуетъ, что мѣсто сухое.

Не должно также становиться лагеремъ близъ дремучихъ лѣсовъ: они прелятствуютъ свободно проходить вѣтрамъ. Отъ чего въ околичности воздухъ сырой и спермійся бываетъ.

Однако если необходимая нужда требуетъ разположиться лагеремъ на сыромъ мѣстѣ: то должно въ таковомъ случаѣ чаще обыкновеннаго перемѣнять солому, которая въ мѣсто постели солдатамъ служитъ. Что касается до Офицеровъ; то они весьма хорошо здѣлаютъ, если намазанную воскомъ холстину подъ свою постелю подстилатъ будутъ.

Во время дождя чемъ больше парусина въ полаткахъ натянута: тѣмъ меньше воды пропускаетъ. Маленькіе рвы выкопанные около полатокъ, собирая въ себя дождевую воду, осушаютъ также то мѣсто, на которомъ солдаты спать ложатся.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

VI. Когда армія долго стоитъ на одномъ мѣстѣ; то исхожденіе нечистыхъ паровъ отъ множества народу всегда причиняетъ болѣзни: а наипаче, когда чрезъ долгое время никакого движенія въ воздухъ посредствомъ вѣтровъ не будетъ; лучше же всего опасаться болѣзней должно въ то время, когда воздухъ теплый и мокрый посредствомъ дыханія въ лѣгкое входитъ. Переменная мѣста много споспѣшествуетъ къ сохраненію здравія воиновъ, а наипаче когда кровавой поносъ усиливаться станетъ. И тогда больше еще удаляться должно дремучихъ лѣсовъ: ибо они, какъ выше упомянуто, прелѣтствуютъ, что вѣтеръ проходить не можетъ.

VII. Ничемъ себя столько не повреждаютъ солдаты, какъ тѣмъ, когда вспотѣвши и разгорячившись отъ трудовъ, скидываютъ съ себя платье на холодномъ воздухѣ, желая простудиться, и пьютъ при томъ съ великою жадностію студеною, а наипаче колодезную воду. Рѣчная вода не столько вредительна въ семъ случаѣ: лучи солнечные, которыми всегда освѣщается, больше оную согреваютъ.

VIII. Во время великаго зноя не должно заставлятъ солдатъ, чтобы они много работали на солнцѣ, буде только безъ того

ПРЕДИСЛОВІЕ.

того какъ нибудь обойтиса можно; и не должно допускать, чтобы они тамъ спали. Кирасиры по большой части отъ солнечнаго зною претерпѣваютъ много, а наипаче когда ихъ кирасы однажды солнечными лучами разгорячатся.

IX. Не можно довольно изъяснить, сколько наблюденіе чистоты солдатамъ нужно. Они должны часто умывать свое лице, руки и ноги, и если погода дозволяетъ, купаться и мыться, какъ возможно часто, въ водѣ текучей.

X. Весьма великое поличеніе о томъ имѣть должно, чтобы много людей въ одномъ мѣстѣ не жило: а если того необходимо потребовать будетъ; то должно по крайней мѣрѣ въ таковомъ жильѣ, сколько возможно часто возобновлять воздухъ, хотя здоровые, хотя больные тамъ будутъ: ибо отъ спертшагося воздуха рождаются весьма опасныя и заразительныя болѣзни.

XI. Хлѣбъ должно дѣлать для солдатъ изъ чистой и неиспорченной муки; при томъ должно квасить и выпекать оный довольно; также чтобы онъ не былъ заплѣсневелый: а иначе весьма же опасныхъ болѣзней причиною будетъ.





О Г Л А В Л Е Н І Е

содержащихся въ книгѣ сей болѣзней.

страниц.

Описаніе болѣзней, которыя случаются весною по выступленіи арміи въ лагерь.	1
О кашлѣ (tussis).	2
О жабѣ (angina).	3
О колотѣ (pleuritis).	7
О колотѣ въ лѣгкомѣ (peripneumonia).	16
О ломотѣ (rheumatismus).	27
О лихорадкахъ или трясучкахъ вообще, (febris intermittens).	32
О лихорадкахъ весеннихъ (febris intermittens vernalis).	35
О лихорадкахъ осеннихъ (febris intermittens autumnalis).	40
О лихорадкахъ четверодневныхъ или четверосуточныхъ (febris intermittens quar).	45
О желтухѣ (icterus).	46
О водяной болѣзни (hydrops).	48
О рвотѣ (vomitus).	54
О рвотѣ съ поносомъ (cholera).	55
О поносѣ (diarrhoea).	57
О кровавомъ поносѣ (dysenteria).	59
О колотѣ въ кишкахъ (inflammatio inte- stinorum).	64
О горячкѣ съ непрерывнымъ бредомъ (phrenitis).	68

О Г Л А В Л Е Н І Е.

О кровотеченіи изъ носу (Hæmorrhagia narium).	-	-	-	71
О горячкѣ (febris continua).	-	-	-	73
О цынготной болѣзни (scorbutus).	-	-	-	80
Объ антоновомъ огнѣ (gangræna).	-	-	-	86
О французской болѣзни (lues venerea).	-	-	-	—
О чесоткѣ (scabies).	-	-	-	91
О глистахъ (vermes).	-	-	-	94



ОПЕЧАТКИ


О П Е Ч А Т К И.

Стран.	Слрок.	Напечатано.	Читай.
9.	11. 12.	смягчительною мазью	мазью большаго проскурняка.
12.	3. 4.	въ продолженіе	въ продолженіи
21.	19.	конечности	конечностей.
22.	18.	которой	которое.
22.	18	смертеленъ	смертельно.
27.	2.	грудное	трудное
31.	28.	бедры	бедра.
32.	1.	положить на руку.	положить.
32.	24. 25.	(de althæa	мазь большаго проскурняка (ung- ventum de althæa)
40.	18.	перестаетъ	перемѣжаетъ
41.	34.	охумал	охумел.
42.	3.	принимать	принимать по- рошокъ.
52.	3. 4.	надуменіе	надменіе
56.	28.	попъ	поносъ
59.	7.	о тяжеломъ кро- вавомъ.	о тяжеломъ или кровоавомъ
64.	15.	болѣзнь	сю болѣзнь.
67.	1. 2.	пластырь назы- ваемый labdanum	пластырь изъ ла- дану (emplastrum e labdano)
71.	23.	narium	narium
74.	8.	предшествуютъ и горячка	предваряетъ горячка и
85.	27.	примѣшаютъ	примѣшаютъ небольше

О п е ч а ш к и.

Стр.	Строк.	Напечатано.	Читай.
87.	6.	porreaх	porreaux
88.	26.	не трудно	можно.
102.	5.	misce	admisce.
102.	16.	auræ	aureæ
106.	7.	polcychr.	polychr.
106.	11. 12.	daicssar.	diateffar.

) o (



П Р И К Л Ю Ч А Ю Щ І Я С Я В Ъ А Р М І Я Х Ъ Б О Л Ъ З Н И.



Когда войска выступаютъ въ лагери рано весною, а особливо въ самомъ началѣ оныя: то всеконечно тогда много больныхъ бываетъ. Болѣзни, которыя усиливаются въ вешнее время, суть побольшей части весьма безпокойный кашель, жаба, колотье въ груди и ломъ.

Всѣ сїи болѣзни хотя ни мало не заразительны: однако пребываютъ, чтобы страждущіе оными были больше на одномъ мѣстѣ въ покоѣ: для того надобно стараться, чтобы больницы или госпитали въ близости учреждены были, въ которыя отсылать таковыхъ больныхъ должно, пустивъ имъ заблаговременно кровь прежде отсылки, если состояніе болѣзни того требовать будетъ: отстрочка худыя слѣдствія навести можетъ.

Во время весны сверхъ того и лихорадки иногда приключаются. Однако онѣ обыкновенно не столько упорны бываютъ, какъ

А

тѣ,

Если съ кашлемъ соединена и горячка, въ таковомъ случаѣ надобно кровь пустить, чтобы тѣмъ отвратить колюще, которое отъ жестокаго кашля восплабдовать можетъ.

Когда кашель утихаетъ станеть, и жаркопина выходитъ начнетъ противу прежняго свободнѣе, и будетъ погуще: то сіе значитъ, что болѣзнь къ окончанію приходитъ.



О Ж А Б Ъ.

(Angina)

Если глотаніе или дыханіе здѣлаются не-свободными, и самое дѣйствіе оныхъ соединено будетъ съ чувствительною болью; а причина сего припадка находится будетъ въ шеи или гортани: то таковая болѣзнь называется *Жаба*.

Болѣзнь сія весьма опасна, а временемъ и смертельна бываетъ; именно тогда, когда она занимаетъ дыханіе, или когда больной принужденъ будетъ говорить голосомъ весьма тонкимъ и высокимъ, и когда при томъ въ великомъ безпокойствіи находится. Въ таковомъ случаѣ потчасъ много крови пустить должно, и немедленно приставить рожки или банки на затылокъ, чрезъ что часто скорое облегченіе дѣлается. При томъ должно безпрестанно держать во рту теплое лѣкарство, подъ числомъ 1 предписанное, и прикладывать также къ шеи днемъ и ночью припарку предписанную подъ числомъ 3.

Если больной можетъ еще глотать: то должно ему давать чрезъ часъ по чайной чашкѣ теплаго албкарства предписаннаго подъ числомъ 1, прибавивши на всякой фунтѣ третью часть золотника чистой селистры.

Если шея или грудь у больного начнетъ краснѣть: то таковой больной часто выздоравливаетъ. Сія болѣзнь не рѣдко смертельна бываетъ; хотя она не такъ часто приключается, какъ слѣдующая, о которой теперь говорить буду.

Одна изъ желѣзъ называемыхъ миндалины, также совмѣстная часть нѣобной завѣсы пухнутъ, рдяня, болянтъ, и боль обыкновенно простирается во внутреннюю часть уха, на той же сторонѣ, на которой и желѣза разпухла.

По прошествіи одного или двухъ дней болѣзнь занимаетъ и другую желѣзу, между тѣмъ опухоль первой желѣзы опадаетъ. Въ сей болѣзни бѣеніе жилъ иногда скорое и твердое, а иногда порядочное бываетъ.

Въ первомъ случаѣ и моча краснѣе обыкновеннаго становится, и тогда должно кровь бросить, и нѣсколько разъ тоже самое повторить, если послѣ перваго кровопущенія опухоль, необыкновенная краснота гортани, и неспособность къ глотанію не уменьшатся.

Въ другомъ случаѣ, то есть, когда бѣеніе жилъ порядочное бываетъ, не нужно кровопусканіе, развѣ больной будетъ многокровенъ.

Въ пищу долженъ онъ употреблять жидкую похлебку, въ которую примѣшать можно киселя сдѣланнаго изъ сарацинскаго пшена или ячныхъ крупъ.

Чрезъ

Чрезъ часъ надобно давать больному по крайней мѣрѣ, когда не спитъ, по чайной чашкѣ питья предписаннаго подвѣ числомъ 4. При томъ долженъ онъ держать часпо ворту теплое полосканье, предписанное подвѣ числомъ 5 мѣ.

На другой день должно ему дать слабительное предписанное подвѣ числомъ 6; и если болѣзнь не уничтожится: то должно тоже самое повторить по прошествіи двухъ дней; а между тѣмъ въ другіе дни продолжать надобно употребленіе лѣкарствъ предписанныхъ подвѣ числомъ 4 и 5, до тѣхъ поръ, пока больной получишь свободу глотать, и пока зіянія рдѣшь перестануть.

Если болѣзнь продолжалась чрезъ долгое время безъ врачеванія; или если нарывъ былъ весьма сильной, то оной въ гной превратится.

Что такое превращеніе возпослѣдуетъ, предвидѣшь можно, когда нарывъ въ зіяніяхъ продолжается чрезъ три дни сряду безъ всякаго послабленія. Въ таковомъ случаѣ должно больному держать безпрестанно во рту теплое лѣкарство предписанное подвѣ числомъ 7, или вливать тоже самое въ гортани посредствомъ насоса.

При томъ прикладывать должно около шеи густую припарку предписанную подвѣ числомъ 8.

Если послѣ того опухоль въ гортани умягчится: то слѣдуетъ нарыву скоро прорваться. И потому примѣтивъ мало возвышенное бѣлое пятно, можно проколотъ оное орудіемъ называемымъ фаринготомъ (сирѣчь

гортанносѣчецѣ), чтобы гной тѣмъ скорѣе и удобнѣе могъ вытечь.

Когда нарывъ либо самъ отъ себя прорвется, либо пособіемъ вышеупомянутого орудія проколотъ будетъ: то надобно часто употреблять предписанное подѣ числомъ 9 полосканье. Послѣ чего скоро больной здоровъ будетъ.

Когда опухоль не допускаетъ отнюдѣ ничего глотать, въ таковомъ случаѣ должно чрезъ четыре часа ставить клистеръ, составленный изъ одного фунта свѣжаго молока, и изъ полуфунта ячнаго взвару, и держать оный въ себѣ больному столь долго, сколько возможно. Симъ образомъ можно спасти его отъ голоду до тѣхъ поръ, пока нарывъ прорвется.

Есть еще другій родъ жабы, который удобно исцѣляется; если въ самомъ началѣ спараніе приложено будетъ: но когда безъ всякаго врачеванія съ небреженіемъ оставляется; то онъ превращается въ нѣкоторой видъ Антонова огня, и разбѣдаетъ большае зараженныя части, которыя послѣ весьма смрадной духъ имѣютъ.

Сперва оказывается на миндалинахъ, на завѣсѣ нѣбной, и на внутренней сторонѣ щекъ и губъ одно, или многія пятна, которыя въ разномъ степени болѣзни разной цвѣтъ имѣютъ, иногда бѣлый, иногда желтоватый, а иногда черный. Околичности сихъ пятенъ рдѣютъ и болятъ; однако часто случается, что больной никакой горячки при томъ не имѣетъ, и опухоль впрочемъ здѣсь не столь велика бываетъ, какъ въ другомъ родѣ жабы, о которомъ упомянуто выше.

Сія пятна обыкновенно пропадаютъ скоро, если зараженные оными части намазывать слегка посредствомъ кисточки предписаннымъ подъ числомъ 10 лѣкарствомъ шесть разъ днемъ, и если при томъ наливши горячей воды на бузиновой цвѣтъ, такъ какъ обыкновенно чай наливаемъ, полоскать оною ротъ: не худо также больному и внутрь принимать по нѣскольку чашекъ той воды четыре раза въ день.

Если вышеупомянутыя пятна больше разпространяться и умножаться будутъ съ великимъ смрадомъ, что не рѣдко случается, какъ явствуетъ изъ примѣчаній: то должно въ таковомъ случаѣ увеличить количество кислоты простой соли (*spiritus salis marini*), чтобы тѣмъ пресѣчь разпространеніе болѣзни.



О КОЛОТЬѢ ВЪ ГРУДИ.

(Pleuritis).

Колотье оказывается острою и пронзительною въ груди болью соединенною съ горячкою.

Сія болѣзнь чувствительнѣе бываетъ, когда больной при дыханіи тянетъ въ себя воздухъ; а умаляется когда оной выпускаетъ, или когда удерживаетъ духъ. Біеніе жилъ обыкновенно бываетъ твердое, какъ то и во всѣхъ жестокихъ и горячихъ болѣзняхъ: впрочемъ въ сильномъ колотьи болѣзнь бываетъ столь жестока и чувствительна, что больной едва

дышать можетъ. Лице въ то время начинаетъ синѣть, больной чувствуетъ сильное удушье, и въ такомъ состоянїи бїеніе жилъ бываетъ мало и слабо.

Кашель иногда почти непрерывный, а прекращается только жестокостію боли; иногда, что весьма опасно, кашель сей бываетъ сухъ и безъ всякой мокроты; а иногда, что не столь опасно, съ начала болѣзни бываетъ онъ съ мокрою.

Хотя сія болѣзнь занимаетъ по большей части боковыя грудныя мѣста: но со всѣмъ тѣмъ можетъ она равномерно какъ передней такъ и задней части коснуться.

Но если боль чувствительнѣе бываетъ на наружныхъ мѣстахъ, а наипаче если она становится жестокою, когда допретъ до тѣхъ мѣстъ; то тогда называютъ ее обыкновенно лживымъ колопьемъ (*pleuritis frugia*), которое слѣдующимъ образомъ врачевать должно.

Первое и главное въ сей болѣзни средство есть кровопусканіе. Оно учинить надлежитъ изъ руки той стороны, въ которой и боль мѣсто свое имѣетъ. Количество пущенной крови должно простираться до фунта, либо и болѣе, если больной дороденъ и многокровенъ будетъ. Въ то время, когда жила отворена, долженъ больной посильнѣе дышать и кашлять. Кровопусканіе обыкновенно уменьшаетъ сію болѣзнь, а иногда и совсѣмъ пресѣкаетъ.

Но томъ не худо ставить больному чрезъ нѣсколько часовъ предписанное подъ числомъ 11. промывательное.

Надобно

Надобно также безпрестанно приклады-
вать къ больному мѣсту суконку или фла-
нель намоченную означенною подѣ числомъ 12
припаркою.

Но какъ въ nocturnое время возобновлять
припарку не удобно: то можно вмѣсто оной
приложить на ночь пластырь, называемый de
labdano, намазавъ оной на холщину, либо на
лайку.

По утру должно отнять сей пластырь,
и мазать больное мѣсто смягчительною
мазью, (unguentum de Althæa), и опять при-
грѣвать означенною подѣ числомъ 12 при-
паркою. И когда больной не спитъ, то чрезъ
всякіе полчаса давать ему по ложкѣ показан-
наго подѣ числомъ 13 лѣкарства, а по при-
нятіи онаго выпить ему чашку теплаго подѣ
числомъ 1 означеннаго взвару, къ которому
прибавить должно на фунтъ одну унцію
меду.

Часто случается, что боль отъ крово-
пущанія гораздо уменьшившаяся, или и со-
всѣмъ миновавшаяся, паки возобновляется съ
такою жестокостію, какъ была съ начала.
Въ такомъ случаѣ вторично кровь пускать
потребно, но обыкновенно меньше, нежели
въ первой разѣ. Если же и послѣ сего боль
возобновится: то должно и въ третій разѣ
кровь пускать, а иногда и въ четвертый,
смотря по жестокости болѣзни.

Однако должно вѣдать, что слабые оста-
тки болѣзни, которые малое только въ ды-
ханіи препятствіе причиняютъ, не требу-
ютъ вторичнаго кровопущенія. Ибо безвре-
менное кровопущаніе приведетъ больного въ
такую

такую слабость, что онъ долго послѣ сего не оправится.

И для того въ такихъ только случаяхъ надлежитъ повторять кровопусканіе, когда боль столь еще сильна, что чувствительно препятствуетъ дыханію. Сильное бѣненіе жилъ, которое обыкновенно въ семъ случаѣ бываетъ, показываетъ въ томъ необходимость.

За хорошей знакъ почитать должно, когда боль на другое мѣсто переходитъ, и занимаетъ ключицы (claviculæ), лопатки, плечи и спину. И таковая новая боль не требуетъ повторнаго кровопусканія.

Такая переменна наиболѣе случается около шестаго дня продолжающейся болѣзни. И тогда надобно только шепеть слегка тѣмъ мѣстамъ, въ которыхъ боль мѣсто свое имѣетъ; а потомъ мазать смягчительною мазью зѣланною изъ корня большаго проскурняка (unguentum de althæa).

Пищу больной употреблять долженъ легкую; какъ то жидкой бульонъ, печенныя яблоки, и хорошо выпеченный хлѣбъ.

Вмѣсто обыкновеннаго питья можетъ онъ употреблять предписанный подъ числомъ 1 взваръ, или ячную воду, примѣшавъ въ оную четвертую долю свѣжаго молока.

Если у больного нѣту на низѣ, то означенное подъ числомъ 11 промывательное повторить можно.

Когда дыханіе зѣблается посвободнѣе, и боль знатно уменьшится: тогда долѣетъ давать только больному чрезъ два часа по ложкѣ состоящаго подъ числомъ 13 лѣкарства, которое

которое онъ запивать долженъ чашкою теплаго означеннаго подъ числомъ 1 взвару.

Но если и по многократномъ кровопусканіи боль примѣтно еще не умягчается; а особливо если въ груди хрипитъ, и харкотина не выходитъ, и слѣдовательно легкіе мокротою наполнены: то въ такомъ случаѣ надобно приложить къ икрамъ шпанскіе мухи.

Крѣпкія шпанскія мухи, приложенныя къ больному мѣсту, часто производятъ весьма хорошее дѣйствіе, когда многократное кровопусканіе не здѣлало никакова въ боли облегченія.

Въ сей болѣзни, такъ какъ и въ другія горячія болѣзняхъ, должно наблюдать, чтобы больной не находился въ чрезмѣрно жаркомъ мѣстѣ, и воздухъ былъ бы всегда свѣжъ и благорастворенъ.

Когда болѣзнь начинаетъ умягчаться употребленіемъ вышеозначенныхъ лѣкарствъ: то больной новые имѣетъ припадки, которые предъявляютъ вареніе матеріи болѣзни причиняющей, и находящейся уже въ готовности изъ тѣла выйти.

Въ такомъ случаѣ должно всемѣрно беречься, чтобы такому выходу препятствія не здѣлать: напротивъ того извѣскивать еще надобно всевозможнѣйшія по искусству средства, чтобы оному споспѣшествовать. Въ чемъ надобно наблюдать слѣдующее.

Открытой почечуй есть благотворителенъ; моча, въ которой осадка бываетъ бѣловата, красновата, а иногда темновата, также есть хорошимъ предзнаменованіемъ, и
печенію



печенію оной способствовать должно. По-
тому больной и пить много долженъ. **Желтое и желчное испражнение въ про-**
долженіе болѣзни послѣ уменьшенія припад-
ковъ, которое дѣлаетъ больному облегченіе,
есть также хорошимъ знакомъ: но въ началѣ
болѣзни часто бываетъ сіе худымъ предзна-
менованіемъ.

Впрочемъ болѣзнь сія приходитъ обыкно-
венно къ окончанію чрезъ исходъ харкопины,
особливо же когда она показывается въ болъ-
шомъ количествѣ, и когда умяетъ колотье,
а больше всего, если сія мокрота бываетъ
врѣлая и гноеватая. Иногда бываетъ она
клейкая, тянется и сукровична: но и тогда
ничего не должно опасаться, если только
боль утихаетъ, горячка умяется, и ды-
ханіе свободнѣе становится: а только дол-
жно отъ вторичнаго кровопусканія удер-
жаться, которое въ такихъ обстоятель-
ствахъ вредно бываетъ. Временемъ слу-
чается, что мокрота выходитъ желтоватая,
и съ кровавыми полосками смѣшенная, что
также хорошимъ есть знакомъ.

Наконецъ должно принять за главное пра-
вило, что исхожденіе харкопины всегда хо-
рошимъ признакомъ бываетъ; если только
мокрота выходитъ свободно: если съ исхо-
жденіемъ оной уменьшается боль и горячка;
и если чрезъ то дыханіе дѣлается свободнѣе.

Когда исхожденіе харкопины бываетъ
такое, какъ выше сего описано: то надобно
оставить употребленіе лѣкарства предпи-
санаго подъ числомъ 13; а вмѣсто того
давать

давать другое подѣ числомъ 14 означенное, котораго принимать больной долженъ чрезъ часъ по двѣ ложки, и глотать оное полегоньку; потомъ запить чашкою теплаго взвару, предписаннаго подѣ числомъ 1.

Если показавшаяся мокрота вдругъ остановится, и возпослѣдуетъ храпленіе въ груди совокупленное съ тоскою: то больной въ превеликой опасности находится. Въ семъ случаѣ должно безъ малѣйшаго замедленія приложить къ икрамъ шпанскіе мухи, и чрезъ четыре часа давать больному порошокъ означенный подѣ числомъ 15, и пить часто теплый взваръ, подѣ числомъ 1 означенный, пока появится опять мокрота и здѣлается въ груди полегче.

Дѣлается иногда, но только не такъ часто, за ушами или въ пахахъ опухоль съ болью, и во время сего припадка уменьшается грудная боль: въ такомъ случаѣ, не упуская времени, должно тотчасъ употреблять густую припарку подѣ числомъ 8 предписанную, или другую сей подобную, чтобы послѣ можно было созрѣлую опухоль прорѣзать ланцетомъ, и лѣчить такъ какъ чирей.

Впрочемъ случается, что колотье столь жестокое бываетъ, что самые дѣйствительнѣйшія лѣкарства никакова успѣху не имѣютъ, и не могутъ изгнать матеріи, которая болѣзнь причиняетъ. Тогда зардѣвшаяся опухоль перемѣняется въ нагноеніе, которое всегда бываетъ опасно. И тогда болѣзнь весьма часто перемѣняется въ чахотку, если въ самой скорости собравшійся гной не будетъ очищенъ.



А такіе въ больномъ припадкѣ познаются изъ слѣдующихъ признаковъ.

Боль бываетъ непослабна, хотя не столь жестока какъ съ начала болѣзни; она соединена съ сухимъ кашлемъ, или съ незрѣлою мокротиною; бѣненіе жилъ скорое и безпрестанное, а по принятіи какой либо пищи также и къ ночи бѣненіе оныхъ и того еще становится скорѣе; щеки и губы рдятся; въ ознобъ бросаетъ весьма часто; а ночью въ потъ; моча выходитъ пѣнистая, и нѣсколько только красна; лице худѣетъ, и чрезвычайная приходитъ слабость. Здѣлавшійся на упомянутыхъ частяхъ нарывъ иногда очищается харкопиной. Когда она начнетъ выходить; и при томъ бываетъ гноеватая: тогда надлежитъ давать больному чрезъ часъ лѣкарство подъ числомъ 16 означенное, подсладивъ оное немного медомъ; а вмѣсто кушанья употреблять похлебку вареную со свѣжимъ крвелемъ (*saxefolium*), салатомъ и петрушечнымъ корнемъ.

Въ питье надобно употреблять ячную воду, примѣшавъ четвертую долю свѣжаго молока; и оное питье употреблять до тѣхъ поръ, пока гноеватая сія матерія очистится.

Но такая удача не всегда бываетъ: ибо въ семъ случаѣ часто дѣлается пузырь, который наполняется гноемъ. Въ такихъ обстоятельствахъ всевозможныя надобно употребить старанія, чтобъ извлечь наружу собравшуюся матерію.

Съ начала болѣзни весьма полезно назначить самое больное мѣсто небольшимъ пластыремъ,



стыремъ, который держался бы крѣпко: потому что если колотье перемѣняется въ нарывъ, то привалъ гноя на томъ же самомъ мѣстѣ послѣдуетъ.

И такъ, когда по вышесказаннымъ знакамъ примѣчено будетъ, что дѣлается нарывъ, то назначенное мѣсто слабо разбѣдающими лѣкарствами разсправить должно; и какъ только будетъ оное отверсто, надобно стараться, чтобы въ томъ мѣстѣ гноепревращеніе продолжалось, и тогда твердо можно надѣяться, что гной будетъ имѣть свое изпеченіе въ томъ мѣстѣ, въ которомъ меньше сопротивленія сыщется, и свободно выйдетъ: ибо собраніе матеріи часто останавливается между подреберною плѣвою и между соединенными съ оною частями.

По той же самой причинѣ продѣваютъ съ успѣхомъ заволоку (setaceum) на томъ мѣстѣ, на которомъ покажется нарывъ; и дѣйствительно посредствомъ оныя часто истекаетъ гной чрезъ здѣланное искусствомъ отверстіе.

Если находящійся въ нарывѣ гной не будетъ извлеченъ наружу: то оной давить станетъ подреберную плѣву ко внутренности груди; отъ чего легкое припѣснено будетъ, тоска всякой день умножаться станетъ, и на конецъ подреберная плѣва прорвется; чемъ хотя всѣ припадки вдругъ исчезнутъ, но скоро потомъ паки появятся, и гной въ грудную пустоту войти можетъ.

Въ сихъ обстоятельствахъ нѣтъ другаго къ излѣченію средства, какъ токмо оперировать грудь операціею, называемою *прободеніе груди* (*paracentesis pectoris*), и тѣмъ какъ можно скорѣе вывести оставшійся въ груди гной, а инако больной получитъ сухотку, за которою воспослѣдуетъ смерть.

Когда сіе послѣднее употребляется средство; то между тѣмъ должно продолжать употребленіе предписаннаго подѣ числомъ 16 лѣкарства.

Если во время болѣзни больной не спитъ; то можно давать ему къ ночи по фунту миндальнаго молока предписаннаго подѣ числомъ 17, примѣшавъ къ оному одинъ унцъ сиропу, сабланнаго изъ бѣлаго маку, или и больше, если надобность будетъ.



О КОЛОТѢ ВЪ ЛЮГКОМЪ.

(Pleuripneumonia)

Колотье въ люгкомъ есть болѣзнь опасная, и страшнѣе самаго груднаго колотья, которое также иногда перемѣняется въ колотье бываемое въ люгкомъ, когда больной принужденъ бываетъ отъ жестокой боли задерживать дыханіе.

Трудное дыханіе, тягость и стѣсненіе въ груди, жестокая и непрестанная горячка показываютъ колотье въ люгкомъ. Въ сей болѣзни больной никакой не чувствуетъ боли, или хотя она и бываетъ, однако тупая. Чрезъ сіе то различается колотье въ люгкомъ отъ



опѣ колошья въ груди, которое при вздыханіи чувствительную причиняетъ боль. Бїеніе жилъ (пульсъ) въ описываемой болѣзни бываетъ не такъ твердо, какъ во время колошья въ груди и другихъ горячихъ болѣзняхъ; но напротивъ того часто усматривается оное мягче.

Если колошье въ лѣгкомъ бываетъ сильное, то вдругъ больной приходитъ въ великую слабость; бїеніе жилъ становится малое, мягкое, неравное; дыханіе краткое, частое, тяжелое, и соединенное съ безпрестаннымъ кашлемъ; больной лежать не можетъ, опасаясь чтобы незадохнуться, и принужденъ бываетъ сидѣть въ постелѣ; лице, глаза, языкъ и губы становятся красны и надуты; за сими припадками слѣдуетъ несносная тоска, послѣ которой больной брѣдитъ начинаетъ, и наконецъ умираетъ.

Всѣ вышеупомянутые знаки весьма худыя слѣдствія предвѣщаютъ.

Напротивъ того чемъ тверже бываетъ бїеніе жилъ; чемъ свободнѣе дыханіе; чемъ больше лежать въ постелѣ можно; чемъ меньше лице, глаза и губы рдятся и надуваются: тѣмъ меньше опасности бываетъ.

Въ сей болѣзни должно употреблять немедленно скородѣйствующія средства: ибо она въ короткое время ввергаетъ больного въ явную опасность.

Во первыхъ должно пустить много крови изъ руки, и повторять оное такъ, какъ предписано въ колошѣ, если тоска и трудность въ дыханіи не умягчаются. Когда пущенная кровь остается жидка, и нимаю



не сбѣдается; когда послѣ кровопусканія дыханіе не становится свободнѣе: то сіе худымъ знакомъ почитать должно; ибо показываетъ, что самая густая матерія осталась въ лёгкомъ, а только самая тонкая сыскала себѣ проходъ. Въ семъ случаѣ новое кровопусканіе никакова дѣйствія не возымѣетъ: ибо чрезъ оное уменьшится только та часть крови, которая не столь густа, и которая могла еще пройти чрезъ лёгкое.

По прошествіи нѣсколькихъ часовъ послѣ кровопущанія къ спани будетъ поставитъ больному промывательное подъ числомъ 11 означенное, и можно также прикладывать къ груди припарки, мази и пластыри. Однакожъ не должно ожидать отъ сихъ лѣкарствъ столь же хорошаго успѣха, какой производятъ оныя въ грудномъ колотѣ.

Въ семъ случаѣ лучше полотенце либо Грецкую губку намочивъ въ горячей водѣ, держатъ близъ рта и носа, дабы горячей воды паръ могъ входить въ лёгкое съ воздухомъ.

Пища въ сей болѣзни, такъ какъ и въ грудномъ колотѣ, должна быть самая легкая, и похлебка еще гораздо жиже.

Вмѣсто обыкновеннаго питья должно употреблять взваръ подъ числомъ 1 означенный, или ячную воду, но вмѣсто молока должно примѣшивать на фунтѣ полбунца чистаго меду.

Надобно чрезъ полчаса давать больному, если онъ не спитъ только, положкѣ лѣкарства предписаннаго подъ числомъ 13, которое онъ при всякомъ разѣ запивать долженъ чашкою теплаго взвару предписаннаго подъ числомъ 1.

Если

Если послѣ употребленія означенныхъ лѣкарствъ тоска умалается; дыханіе становится свободнѣе; горячка не столь жестока; біеніе жилъ сильнѣе и порядочнѣе; если языкъ не сухъ, жаръ вездѣ ровенъ и даже до самыхъ конечностей тѣла простирается; а особливо если кожа влажна и мягка становится: то всѣ сїи знаки суть благонадежны: только надобно продолжать употребленіе тѣхъ же самыхъ лѣкарствъ: ибо тогда болѣзнь сія начинаетъ умалаться и проходить нечувствительно.

Но не лзя нимало надѣяться, чтобы сіе такъ збылося: развѣ болѣзнь будетъ умѣренная; твердыя части будутъ довольно гибки; и съ самаго начала будутъ употреблены лѣкарства.

Гораздо чаще случается, что матерія сей болѣзни очищается жаркопиною.

И такъ прилѣжно надобно разсмаатривать жаркопину. Если же больной вовсе не жаркается, и при томъ дыханіе бываетъ тяжелое, и начинаетъ въ груди храпѣть: то сїи припадки худыя слѣдствія предвѣщаютъ.

Жаркопина въ то время хорошею очищается, когда она выходитъ скоро, удобно, довольнымъ количествомъ, и при томъ густая. Иногда бываетъ она желта и нѣсколько съ кровью смѣшенная: но сего опасаться не должно; потому что такая мокрота также хороша, и скоро бѣлѣетъ.

Происходящая отъ таковой жаркопины польза познается чрезъ уменьшеніе тоски, чрезъ свободу въ дыханіи, и чрезъ біеніе жилъ, которое дѣлается сильнѣе и полнѣе.

Въ то время должно давать больному чрезъ часъ по двѣ кофейныя ложечки лѣкарства подѣ числомъ 14 предписаннаго, которое долженъ онъ глотать полегоньку, а потомъ запить чашкою теплаго, подѣ числомъ 1 предписаннаго, взвару.

Въ сихъ обстоятельствахъ не должно ничего болѣе дѣлать: ибо въ такомъ случаѣ кровоупусканіе, проносное и принужденной потъ вредительны бываютъ.

А только въ то время должно беречься холоднаго воздуха и студенаго питья: ибо и то и другое останавливаетъ мокроту, и чрезъ то ввергаетъ больного въ превеликую опасность.

Если мокрота остановится, тогда опять придетъ, а потомъ и храпленіе: то должно приложить къ икрамъ испанскіе мухи, давать чрезъ четыре часа порошокъ подѣ числомъ 15 предписанный, и велѣть пить побольше взвару подѣ числомъ 1 означеннаго, какъ о томъ упомянуто въ описаніи груднаго колотья.

Также долженъ больной втягивать ртомъ и носомъ паръ изъ горячей воды исходящій.

Сверхъ того случается иногда, что во время болѣзни выходитъ низомъ желтая и желчная матерія, и больной чувствуетъ облегченіе. Такое исхожденіе равнымъ образомъ хорошія слѣдствія предзнаменуетъ, о чемъ мы и въ описаніи груднаго колотья упомянули.

Моча, въ которой осадка дѣлается густая и довольномъ количествомъ, и которая будучи сперва красна дѣлается потчасъ бѣлою, также почитается хорошимъ знакомъ. Тогда равно какъ и въ грудномъ колотѣ больной долженъ
пить



пить много. Однакожъ рѣдко случается, чтобы матерія, которая болѣзнь причиняетъ, одною мочею прошла, но по большой части и жаркотина въ то же время наступаетъ, и способствуетъ къ совершенному излѣченію.

Если въ груди станетъ легче отъ такого испражненія: тогда можно больному давать бульонъ погуще или посочнее. Давать же оной почаще да понемногу въ одинъ разъ, дабы не опяготить опять легкаго излишнимъ питательнымъ сокомъ (chylus).

Иногда такъ же выходитъ у больного много изъ носу крови, отъ чего получаетъ онъ облегченіе; но сіе рѣдко случается.

Если въ четырнадцатъ дней никакое изъ вышепомянутыхъ не воспослѣдуетъ испражненіе; если сильная горячка и сухой кашель продолжается; если жаръ простирается даже до конечности тѣла; если бѣшеніе жилъ скорое, мягкое, но поднимающееся, то опускающееся; если тяжесть въ дыханіи и ознобъ сопряжены съ сими припадками; если щеки и губы красны; если жажда великая, и если наконецъ горячка къ ночи становится сильнѣе: то сіе значитъ, что матерія боль въ лѣгкомъ причиняющая перемѣняется въ нарывъ.

А что нарывъ уже дѣйствительно здѣлся въ лѣгкомъ, можно знать, если кромѣ означенныхъ припадковъ, сухой кашель продолжается съ упорствомъ, и при томъ умножается, когда больной чего нибудь поѣстъ, или здѣлаетъ какое движеніе; если онъ только на больномъ боку лежать можетъ; если имѣетъ слабую горячку, которая умножается послѣ кушанья, питья и движенія, и съ которою



румянецъ на губахъ и щекахъ соединенъ бываетъ. Больной лишается тогда позыву на пищу, жажду имѣетъ неутолимую, ночью потѣетъ, а особливо голова и верхняя часть груди; моча исходитъ пѣнистая, лице худѣетъ, и превеликая приходитъ слабость.

Въ то время, какъ нарывъ остается не прорванъ, гноеватая болячка часъ отъ часу возрастаетъ, стѣсняетъ здоровыя еще легкаго части, препятствуетъ дыханію, а наконецъ причиняетъ ужаснѣйшую тоску и удушаетъ больного.

И для того крайне стараться надобно, чтобы сей нарывъ прорвался, и чтобы гной могъ изъ онаго вытечь. Но оной можетъ прорваться такъ, что гной разольется въ груди, и отъ того здѣлается чирей (емруета), которой всегда почти бываетъ смертеленъ.

Такой случай можно узнать чрезъ внезапное уменьшеніе всѣхъ припадковъ, которое иногда съ легкимъ обморокомъ приключается, и чрезъ совершенное прекращеніе гноеватой харкотины (*grutum purulentum*.) И хотя нарывъ дѣйствительно прорвавшись припадковъ, отъ разширенія гноеватаго пузыря происходящихъ, произвестъ не можетъ: однако гной разлившійся во внутренности груди ежедневно умножаясь, и дѣлаясь острѣе, причиняетъ новые припадки хуже еще первыхъ.

Единственный въ такомъ случаѣ остается въ излѣченію способъ здѣлать прободеніе груди (*paracentesis pectoris*). Но понеже легкое отъ гною повреждено остается: то и послѣ прободенія груди немного надежды остается, хотя

хотя бы гной и вытекъ; и больной всегда почти послѣ такой операціи умираетъ.

Лучше желать надобно, чтобы нарывъ прорвался такъ, чтобы гной стекалъ въ хрящевые лёгкаго сосуды (bronchia), и такъ бы могъ выйти жаркотиною.

Если сіе случится: то всеконечно опасаться должно, чтобы множество гною вдругъ разлившись въ хрящевые сосуды, не наполнило бы оныхъ совершенно, и слѣдовательно не задушило бы внезапно больного. Если вливающейся въ сіи сосуды гной можетъ отшуду выйти посредствомъ кашля: то больной часто избавляется отъ смерти; хотя чахотки всегда опасаться должно.

Главные средства споспѣшествующія къ тому, чтобы здѣлавшійся нарывъ прорвался въ воздушные сосуды, и гной жаркотиною вышелъ, суть слѣдующія:

Примѣтивши вышеозначенные здѣлавшагося нарыву знаки, должно приказать, чтобы больной втягивалъ въ себя безпрестанно ртомъ и носомъ исходящій изъ горячей воды паръ, дабы чрезъ то больныя мѣста размягчались.

Потомъ должно давать больному похлебку немного жирнѣе и въ большемъ количествѣ нежели прежде, чтобы, когда желудокъ наполнится, грудная преграда (diaphragma) не такъ свободно выпускалась, и тѣмъ бы больше нарывъ былъ придавленъ. Въ больномъ должно причинить кашель, держа подъ его носомъ теплый уксусъ, либо велѣть ему кричать громко. Такимъ образомъ иногда можно здѣлать, что нарывъ прорвется; но



если сего здѣлать не можно, то надобно провозить его въ каретѣ и трясти по худымъ дорогамъ, если только силы дозволяютъ.

Впрочемъ какъ нельзя узнать времени, въ которое нарывъ прорвется: то должно вышеозначенныя покушенія въ разное время дѣлать.

Если послѣ того, какъ нарывъ прорвется, жаркотина выходитъ гноеватая, бѣлая и ровная; если горячка проходитъ, либо знатно умалается; на бѣду рождаются позывы; умалается жажда; и если наконецъ калъ густой и натуральной исходитъ: то сѣи признаки несумнѣнную подають надежду, что больной выздоровѣть можетъ.

Если же напротивъ того жаркотина бываетъ разноцвѣтная и вонючая; если горячка не покидаетъ, или покинувши паки приходитъ; если жажда пребываетъ и позывы на бѣду не прибавляются: то должно опасаться, чтобы больной не умеръ.

Когда нарывъ посредствомъ гноеватой жаркотины очищается: то жидкая изъ сарадинскихъ либо изъ овсяныхъ крупъ молошная каша будетъ хорошимъ кушаніемъ для больного. Но при томъ должно наблюдать, чтобы больной не въ одинъ разъ много, но часто, да понемногу кушалъ.

Вмѣсто питья должно употреблять лѣкарственной чай подѣ числомъ 16 предписанной, примѣшавъ въ оной третію долю молока и немного меду.

Должно также давать больному по три раза въ день порошокъ подѣ числомъ 18 означенный.

Но какъ отъ непрерывно продолжающа-
гося днемъ кашлю лѣгкое упомянуто бываетъ :
то должно стараться , чтобы оной прекра-
тился ночью. Для того долженъ больной
принять въ вечеру двѣ пилюли подѣ числомъ
19 означенныя.

Ни малаго вреда не причиняетъ здѣлав-
шійся у больного небольшой запоръ : но когда
оной продолжаться будетъ чрезъ нѣсколько
дней; то надобно употребить промыватель-
ное подѣ числомъ 11 предписанное.

Если харкотина умалается понемногу ;
апетитъ появляется; силы умножаются; и
больной горячки болѣе не имѣетъ: то должно
ожидать скорого излѣченія.

Если харкотина значно умалилась: то
порошокъ подѣ числомъ 18 и лѣкарственной
чай подѣ числомъ 16 предписанный надобно
оставить; а вмѣсто сихъ лѣкарствъ долженъ
больной принимать три раза въ день, и вся-
кой разъ по три чайныхъ ложечекъ лѣкар-
ства предписаннаго подѣ числомъ 20.

Когдажъ кашель къ ночи опять умно-
жится, и будетъ пыгостенъ: то еще надобно
дать предписанныя подѣ числомъ 19 пилюли,
безъ которыхъ въ противномъ случаѣ обо-
йти можно.

Если нарывъ въ лѣгкомъ начнетъ очи-
щаться харкотиною; и потомъ сѣе очище-
нїе вдругъ остановится: то воспослѣдуетъ
сильная тоска вмѣстѣ съ храпленіемъ въ
груди; и больной въ превеликой опасности
находиться будетъ. Сей припадокъ обык-
новенно случается отъ холоднаго воздуха,
которой по неосторожности впущенъ будетъ



во внутренность; либо отъ великихъ душев-
ныхъ движеній, какъ то отъ гнѣва, страха,
и прочая.

Въ семъ случаѣ должно подать скорую
помощь, приказавъ больному втягивать въ
себя ртомъ и носомъ паръ изъ горячей воды
исходящей, пить потихоньку теплый чай
предписанный подъ числомъ 16, и чрезъ че-
тыре часа принимать порошокъ означенный
подъ числомъ 13, до тѣхъ поръ, пока въ
груди дѣлается легче, и мокрота появится
наки, послѣ чего должно вышеупомянутой
порошокъ оставить.

Не худо также будетъ приложить шпан-
скія мухи къ икрамъ, какъ о томъ сказано
при описаніи груднаго коломба.

Гнойная матерія входитъ иногда во вса-
сывающія жилы; переносится въ другія тѣла
части; и дѣлаетъ въ оныхъ скоропостижно
нарывы, какъ то около ушей, на рукахъ и
на бедрахъ. Въ то самое время грудь полу-
чаетъ облегченіе; и въ семъ случаѣ должно
употреблять тѣ самыя лѣкарства, и наблю-
дать все то, что было предписано въ подоб-
ныхъ нарывахъ, приключаящихся въ грудномъ
коломбѣ.

Какъ рдѣщаяся опухоль внѣшнихъ частей
можетъ превратиться въ затвердѣлость
(scirrhus): то сего же самаго припадка должно
опасаться отъ такой же боли въ частяхъ вну-
треннихъ: ибо послѣ боли въ лѣгкомъ остае-
тся иногда въ ономъ мозолеватая твердость, и
оно въ такомъ случаѣ почти всегда къ под-
реберной плѣвѣ приростаетъ.

Тогда

Тогда чрезъ всю жизнь дыханіе остается грудное, и соединенное со слабымъ кашлемъ, а особливо послѣ кушанья и послѣ движенія, и не примѣчается ни одинъ изъ вышеописанныхъ нарыва знаковъ.

Рѣдко случается, чтобы сію затвердѣлость исцѣлить можно было; хотя и можно здѣлать нѣкоторое облегченіе, котораго однакожъ нельзя ожидать въ военной службѣ, развѣ тѣмъ, которые верховою ѣздою движеніе дѣлать могутъ. А какъ сіе одни только конные учинить въ состояніи: то другихъ инвалидными почитать должно.

Наконецъ если колотье въ лѣгкомъ столь сильное, что лѣкарства безо всякаго дѣйствія остаются: то воспослѣдуетъ Антоновъ огонь (ganggræna), а потомъ и смерть. Что болѣзнь такимъ образомъ окончится, можно предсказать, если больной въ несносной тоскѣ находится, если въ большую и внезапную слабость приходитъ, если бѣненіе жилъ становится неравное, слабое и чрезмѣрно скорое, если наконецъ жаркопина бываетъ жидка, вонюча и синевадая. Всѣ сіи знаки приближающуюся и неизбѣжимую смерть предвѣщаютъ.



О Л О М О Т Ъ.

Rheumatismus.

Болѣзнь сія обыкновенно случается отъ того, когда человекъ отъ труда, либо отъ лѣтняго зноя воспотѣвъ потъ часъ на спужу или

или въ прохладное мѣсто выходить; а наипаче если не въ силахъ будучи сносить жаръ, раздѣнется и будетъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ влажной и холодной воздухъ находится.

Сей болѣзни наиболѣе подвержены бывають солдаты, когда согрѣвшись отъ труда на дождѣ обмокнутъ, и мокраго плаща переимѣнить не могутъ.

Холодные ночи, которыя весною и осенью послѣ нарочито жаркихъ дней бывають, причиняють также ломоту.

Болѣзнь сія начинается ознобомъ во всемъ тѣлѣ; потомъ жаръ, жажда, безпокойствіе и горячка приходятъ. По прошествіи одного или двухъ дней, а иногда и скорѣе, ощущаетъ больной сильную боль, которая не останавливается въ одномъ мѣстѣ, но переходитъ изъ одного члена въ другой, какъ то въ руки, плеча, колѣна и другія тѣла части. Составы сею болѣзнію зараженные рдятся и пухнутъ.

Болѣзнь сія вступаетъ иногда въ протяженія сухихъ жилъ (*expanſio tendinis*), которыя частныя мышцы покрываютъ, и причиняетъ неносную боль, какъ скоро тѣмъ членомъ больной движеніе учинитъ.

Иногда по прошествіи немногихъ дней горячка перестаетъ, но боль продолжается. Впрочемъ болѣзнь сія весьма безпокойна, а особливо если она въ поясницѣ мѣсто свое имѣетъ: ибо въ то время больной принужденъ лежать неподвижно, такъ сказать, какъ колода. Изъ поясницы часто переходитъ она въ бедра, гдѣ чемъ долѣе останавливается, тѣмъ труднѣе становится къ излѣченію.

Понеже

Понеже боль въ сей болѣзни переходитъ часто и внезапно съ мѣста на мѣсто: то должно опасаться, что бы матерія причиняющая ломоту не вошла внутрь, и не заняла бы мѣста въ мозгѣ или лѣгкомѣ, что весьма вредительныя слѣдствія имѣетъ. Припадокъ сей узнать можно изъ того, что больной послѣ, какъ болѣзнь въ членахъ исчезнетъ, начинаетъ брѣдить, или чувствовать великое въ груди стѣсненіе.

Хотя болѣзнь сія рѣдко бываетъ смертоносна; однако причиняетъ жестокую боль, которая чрезъ долгое время продлится, если больной безъ всякаго призрѣнія оставленъ будетъ, и требуетъ хорошихъ и скородѣйствующихъ лѣкарствъ. Ибо если болѣзнь сія закончится: то часто случается, что составы въ згибахъ своихъ движеніе теряютъ, и чрезъ всю жизнь неисцѣлимая недвижимость въ членахъ (anchylosis) остается.

Лѣчить же болѣзнь сію слѣдующимъ образомъ должно.

Надобно выпустить около 10 унцовъ крови изъ руки той стороны, на которой боль мѣсто свое имѣетъ.

Къ больному мѣсту прикладывать должно безпрестанно фланель или суконку обмоченную въ теплой припаркѣ, подѣ числомъ 12 предписанной.

Пища должна быть легкая, какъ то жидкая изъ ячнхъ, овсяныхъ и сарацинскихъ крупъ похлебка, и вареная или печеная яблоки.

Вмѣсто обыкновеннаго питья долженъ больной употреблять взваръ подѣ числомъ

и предписанный, или ячную воду, примѣшавъ четвертую долю свѣжаго молока. Въ то время, когда онъ не спитъ, долженъ принимать всякой часъ по двѣ ложки лѣкарства подѣ числомъ 22 предписаннаго, а запивать чашкою лѣкарственаго чаю подѣ числомъ 23 означеннаго.

На другой день должно поставить больному промывательное, и исправно продолжать употребленіе лѣкарствъ подѣ числомъ 22 и 23 предписанныхъ.

Когда болѣзнь ни мало не уменьшается, и горячка продолжается: то на третій день должно повторить кровопусканіе, и продолжать припарку подѣ числомъ 12, также и лѣкарства подѣ числомъ 22 и 23 предписанныя.

На четвертой день по утру должно давать больному слабительное питье подѣ числомъ 6 предписанное. Во весь тотъ день не надобно давать больному предписанныхъ подѣ числомъ 22 и 23 лѣкарствъ, а дать ему къ ночи боль утоляющее лѣкарство подѣ числомъ 24 означенное.

Потомъ еще чрезъ два дни долженъ онъ употреблять предписанныя подѣ числомъ 22 и 23 лѣкарства, а въ слѣдующій день дать ему паки слабительное подѣ числомъ 6 означенное; а къ ночи боль утоляющее лѣкарство, предписанное подѣ числомъ 24.

Таковыми средствами по большей части вылѣчиваютъ сію болѣзнь. Если въ мочи дѣлается много осадки кирпичнаго цвѣту (*sedimentum lateritium*), и если появится легкій и ровный по всему тѣлу потъ: то такое при-



приключеніе хорошимъ знакомъ почитать должно.

Въ такомъ случаѣ къ совершенному большаго излѣченію потребно только то, что бы онъ содержалъ себя въ постелѣ, и употреблялъ бы только предписанное подѣ числомъ 23 лѣкарство.

Если же послѣ употребленія вышеозначенныхъ лѣкарствъ, болѣзнь не уменьшился ни мало, и больное мѣсто здѣлается красно: то въ такомъ случаѣ къ тому мѣсту пиявицы припустить должно.

Иногда случается, что горячка совсѣмъ покидаетъ, и кажется, что больной приходитъ въ совершенное здравіе: однако боль непрерывно продолжается, и съ одного мѣста переходитъ на другое. Въ такомъ случаѣ должно давать больному по утру, въ полдень и въ вечеру, каждой разѣ по полудраммѣ Венеціанскаго мыла въ пилюляхъ, и запивать двумя чашками теплаго лѣкарственнаго чаю, подѣ числомъ 23 предписаннаго, и при томъ больной долженъ беречься отъ спужи; также не худо тереть слегка больные составы сухою нагрѣтою фланелью или суконкою.

Иногда также случается, что боль въ составѣ бедра перешедши, остается на всегда въ одномъ мѣстѣ, хотя въ прочемъ больной здоровъ будетъ. Въ семъ случаѣ должно приложить къ больному мѣсту пластырь изъ шпанскихъ мухъ величиною въ рубль, которой опять по прошествіи 12 часовъ отнять надобно, и проколовъ здѣлавшійся пузырь, дабы собравшаяся въ ономъ матерія могла выйти,



выйти, положить на руку бѣлильной пластырь (emplastrum album costum).

По прошествіи осми дней, когда уже всѣмъ рана заживетъ, должно паки приложить нарывной пластырь на то же мѣсто. А если и отъ того еще боль со всѣмъ не перестанетъ, то оной пластырь до четырехъ разъ прикладывать можно.

По отнятіи шпанскихъ мухъ надобно только проколотъ пузырь, не снимая верхней онаго кожицы (epidermis); а иначе на обнаженномъ мѣстѣ здѣлается весьма чувствительная боль, которая къ излѣченію сей болѣзни нимало ненужна.

Всѣхъ тѣхъ, кои одержимы были сею болѣзнію въ осень, не должно выпускать зимою на стужу и въ худую погоду: ибо они безъ сомнѣнія паки оную болѣзнь получаютъ.

Если боль чрезъ долгое время въ одномъ мѣстѣ остается, и больной составъ окрѣпнетъ: то должно оной два раза въ день держать надъ паромъ горячей воды, послѣ теплымъ полотенцемъ слегка потирать, а потомъ мазать смягчительною мазью называемою (de althæa)



О ЛИХОРАДКАХЪ ПЕРЕМѢЖАЮЩИХСЯ ИЛИ ТРЯСАВИЦАХЪ ВООБЩЕ.

Лихорадка въ пространномъ разумѣ взятая (febris), есть такая болѣзнь, въ которой ощущается скорое бѣненіе жилъ соединенное вмѣстѣ

виѣстѣ съ необычайнымъ опягощеніемъ тѣла, съ разслабленіемъ членовъ, съ усталостію, съ жаждою, и другими подобными припадками.

Перемѣжающая же лихорадка или трясавица есть такая лихорадка, которая, продолжавшись чрезъ нѣсколько часовъ, уменьшается, и на послѣдокъ совершенно прекращается, такъ что больной отъ всѣхъ болѣзненныхъ припадковъ освобожденъ бываетъ; но по прошествіи извѣстнаго времени паки съ тѣми же припадками на больного нападаетъ.

Лихорадки различныя имѣютъ наименованія по различію времени между однимъ и другимъ пароксизмомъ.

Если пароксизмъ бываетъ всякой день; то такая лихорадка называется *повседневною* (*quotidiana*); если же чрезъ день, то *тридневною* (*tertiana*); а если наконецъ не будетъ оной два дни, и на третій уже появится; то такая называется *четверодневною* (*quartana*).

Лихорадка начинается зѣваніемъ, потягою, разслабленіемъ, ознобомъ, содроганіемъ, тоскою, отвращеніемъ отъ пищи, а иногда и рвотою, блѣдностію конечностей тѣла, слабымъ и малымъ біеніемъ жилъ, и нарочито сильною жаждою.

По прошествіи нѣкотораго времени больного бросаетъ въ жаръ, которой умножается нечувствительно, наконецъ становится чрезвычайно великъ, тѣло рѣшетъ, тоска уменьшается, біеніе жилъ крѣпче и полнѣе становится, жажда поминутъ чрезвычайная, одержимый лихорадкою чувствуетъ въ головѣ и во всѣхъ членахъ великую боль, потомъ по

всему тѣлу выступаетъ потъ, всѣ выше-
означенные припадки умяляются, и находить
по большей части сонъ. Проснувшись больной
нечувствуетъ уже лихорадки, бѣненіе жилъ
становится порядочное, и только остается
слабость и изнеможеніе.

Иногда во время жару рветъ больного
желчью, послѣ чего дѣлается ему легче.

Моча, которую больной по прошествіи
лихорадки или во время поту выпускаетъ,
бываетъ красновата и пѣниста. Когда сія
моча простынетъ, то примѣчается на по-
верхности пѣва или кожица, приставшая
къ сторонамъ урильника, а на днѣ онаго
собирается много осадки, на толченой кир-
пичъ или на арменскую землю (bolus armena)
похожей.

Однакожъ надлежитъ вѣдать, что моча
бываетъ такая только въ осеннихъ лихо-
радкахъ, а особливо когда больной имѣлъ
уже нѣсколько пароксизмовъ. Въ весеннихъ
лихорадкахъ сіе не такъ часто случается:
ибо въ то время моча больного обыкновенно
не столь бываетъ красна, но больше желто-
вата, посреди урильника дѣлается облако
(pubescula), и осадка бываетъ бѣлая, что все
хорошимъ знакомъ почитать должно.

Лихорадки раздѣляются на весеннія и
осеннія, которыя обыкновенно съ большими
сопряжены бываютъ припадками.

Весеннею лихорадкою называется та,
которая начинается въ Февралѣ мѣсяцѣ и
продолжается до Іюля.

А осеннею называется та, которая начи-
нается въ концѣ Іюля, или въ началѣ Августа
мѣсяца,

иѣсяца, а покидаетъ въ исходѣ Генваря, либо и ранѣе.

Послѣ долговременныхъ и сильныхъ лѣтнихъ жаровъ, а особливо когда войско походомъ изнурено, по большей части усиливается осенняя лихорадка.

Осенняя лихорадка усиливается и опасна бываетъ послѣ долговременныхъ и сильныхъ лѣтнихъ жаровъ, а наипаче когда солдаты великими трудами себя изнурили, больше же всего, когда на болотистыхъ мѣстахъ лагерь стоять принуждены бываютъ.

Въ Сентябрѣ и Октябрѣ обыкновенно большее количество народа, нежели въ другое время сею болѣзнію одержимо бываетъ. Но когда листъ съ деревъ опадать начнетъ, а особливо если при томъ случатся великіе вѣтры; то ожидать должно, что число больныхъ уменьшится.

Понеже весеннія лихорадки различествуютъ отъ осеннихъ, и часто различнымъ образомъ онѣ лечить должно: то объ обѣихъ сихъ родахъ порознь говорить нужно.



О ВЕСЕННИХЪ ЛИХОРАДКАХЪ.

Весеннія лихорадки обыкновенно бываютъ придневныя и почти всегда неопасныя. Иногда бываютъ онѣ сугубо придневныя, но не такъ часто какъ осеннія.

Сугубо тридневная лихорадка называется, если въ томъ день, когда больному должно имѣть отъ болѣзни свободу, приходитъ



новой пароксизмъ , которой въ то время обыкновенно бываетъ легче нежели прошедшаго дня.

Во время пароксизма должно только давать больному много питья приятнаго и кровь разжиживающаго ; но оное непремѣнно должно быть теплое : ибо холодное вредъ причинить можетъ.

И такъ больной во время лихорадки пить можетъ предписаннаго подѣ числомъ 25 взвару столько, сколько захочетъ. Долженъ онъ также имѣть покой и въ умѣренной теплотѣ находиться.

Пароксизмъ оканчивается обыкновенно повсюднымъ потомъ, которому споспѣшествовать должно теплымъ питьемъ, но не производимъ онаго насильно излишнимъ одѣяниемъ или другимъ какимъ жаръ возбуждающимъ средствомъ.

Когда лихорадка къ окончанію приходитъ, или уже кончилась: то должно давать больному чаще пить похлѣбку, примѣшавъ въ оную немного лимоннаго соку или перечищеннаго виннаго камня (сметогъ, vel crystalli tartari).

Въ свободные отъ лихорадки дни можно позволить больному пищу питательнѣе. Онъ можетъ ѣсть и мясное, а особливо изъ молодыхъ животныхъ, также и говядину, лишь бы только была она молодая. Но долженъ онъ воздерживаться отъ жирнаго кушанья.

Не долженъ также онъ ѣсть передъ тѣмъ, временемъ, когда лихорадка приходитъ; ибо при-

принятая пища во время пароксизма обременяетъ только желудокъ, а свариться не можетъ.

За четыре часа предъ пароксизмомъ, можно больному дать пюшкой похлебки.

И понеже придневныя весеннія лихорадки часто предупреждаютъ то время, въ которое онъ обратно приходитъ должны: для того надобно предосторожность имѣть въ разсужденіи времени, въ которое больной пищу принимать долженъ.

Если свободной отъ лихорадки день будетъ ясной и тихой: то не худо будетъ больному прогуляться, но не до усталости. Онъ можетъ также спать долѣе обыкновеннаго.

Весеннія лихорадки часто переменяются въ горячки, а наипаче въ молодыхъ и многокровныхъ людяхъ. Въ такомъ случаѣ и кровопусканіе будетъ полезно; а особливо если у больного лице горитъ, если чувствуетъ онъ жестокую въ головѣ боль, и если въ груди имѣетъ колотіе.

Если больной опивращеніе отъ пищи имѣетъ; если часто ему отпрыгается; если языкъ нечистъ; во рту горко, и голова кругомъ ходитъ: то надобно дать ему рвотное. И такъ за четыре часа предъ лихорадкою долженъ больной принять порошокъ подъ числомъ 26 предписанный: если же онъ будетъ слабаго сложенія; то долженъ онъ принять порошокъ подъ числомъ 27 означенный. Какъ скоро по принятіи рвотнаго порошка заблается у больного рвота, то долженъ онъ пить больше теплой воды, которую

онъ выброситъ скоро вторичную рвотую; послѣ сей долженъ онъ еще пить, и такъ далѣе, дабы разжидить все то, чему изъ желудка выпити должно, и чрезъ то бы споспѣшествовать рвотѣ.

Когда выпитая вода въ желудкѣ останется и больного больше рвать не будетъ: то спустя одинъ часъ послѣ послѣдней рвоты должно дать ему предписанное подѣ числомъ 24 лѣкарство, и ожидать лихорадки, во время которой должно пить означенный подѣ числомъ 25 взваръ, наблюдая при томъ все то, что вышеупомянуто.

Если больной чувствуетъ въ поясницѣ боль, если въ кишкахъ находятся вѣтры и ворчаніе бываетъ: если животъ раздутъ и твердъ: то въ такомъ случаѣ не рвотное, но слабительное давать лучше. И такъ за восемь часовъ до лихорадки должно дать больному предписанное подѣ числомъ 28 проносное, а въ шесть часовъ послѣ приему проносного, то есть за два часа до лихорадки, дать ему означенное подѣ числомъ 24 лѣкарство.

Если припадки, которые требовали употребленія рвотного или слабительного еще продолжаться будутъ: то можно повторить тѣ же самыя лѣкарства.

Въ прочемъ въ весеннихъ лихорадкахъ рѣдко случается, чтобы болѣе одного разу рвотное или слабительное давать было потребно.

Иногда рвотное лѣкарство не только рвоту производитъ, но при томъ и слабитъ равномерно какъ и слабительное
иногда

иногда причиняетъ рвоту: для того подобныхъ припадковъ опасаться не должно; ибо единственный лѣкарствъ сихъ предмѣтъ есть потъ, чтобы очистить кишки и желудокъ.

Когда уже желудокъ и кишки очищены будутъ: то долженъ больной принимать каждые два часа по одной ложкѣ предписаннаго подъ числомъ 29 лѣкарства, запивая оное одною чашкою чаю изъ цвѣтковъ ромашки сдѣланнаго.

Однакожъ лѣкарство сѣе употреблять больной долженъ только тогда, когда лихорадки не имѣетъ, а во время оной лѣкарства принимать не надобно.

И такимъ образомъ вылѣчиваются весеннія лихорадки. Рѣдко случается, чтобы Перуанскую лихорадошную корку давать было нужно.

Когда въ тридневныхъ весеннихъ лихорадкахъ послѣ третьяго и четвертаго пароксизма дѣлается сыпь или маленькіе пупырышки около носа, губъ или рта: то сѣе хорошимъ знакомъ почитать должно; ибо лихорадка послѣ того обыкновенно скоро покидаетъ. Но въ тридневныхъ осеннихъ лихорадкахъ знакъ сей ненадеженъ.

Случается иногда хотя и рѣдко, что весенняя лихорадка послѣ семи или осми пароксизмовъ не покидаетъ и не умалается; но еще напротивъ того пароксизмъ дѣлается продолжительнѣе и сильнѣе. Сѣе случается по большей части съ тѣми, которые чуть только въ постелю лягутъ, то уже и потѣютъ чрезвычайно. Въ семъ случаѣ Перуанскую корку употреблять должно.

И такъ въ свободное отъ лихорадки время должно больному давать всякіе при часа одинъ порошокъ подъ числомъ 30 предписанный въ винѣ.

Такимъ образомъ больной скоро отъ лихорадки избавится; и какъ весною день отъ дня погода становится лучше: то болѣзнь рѣдко возвращается.



О ЛИХОРАДКАХЪ ОСЕННИХЪ.

Сѣ лихорадки упорнѣе весеннихъ, и умножаются обыкновенно послѣ весьма жаркаго лѣта.

Ихъ также и узнавать труднѣе. Ибо въ началѣ, какъ онѣ усиливаются, пароксизмъ бываетъ столь продолжителенъ, и усугубленіе онаго столь частое, что они похожи бываютъ на горячку (*febris continua*), такъ что почти никогда не перестаетъ, (*intermittit*) или весьма на короткое время. Иногда однакожъ дѣлаетъ она послабленіе (*remittit*); но по прошествіи нѣсколькихъ часовъ паки больного въ ознобъ бросаетъ, и лихорадка опять ожесточается.

Когда болѣзнь умягчаться начнетъ; тогда въ первые можно узнать, что она есть точная лихорадка; и весьма часто изъ такихъ лихорадокъ, которыя съ начала казались быть непрерывными дѣлаются перемежающимися четверодневными.

Иногда также случается, что такія лихорадки съ начала бываютъ перемежающіяся,

щіяся, а послѣ свои пароксизмы усугубляють или продолжаютъ такъ, что наконецъ превращаются въ непрерывныя и опасныя лихорадки.

Сии лихорадки всегда происходятъ отъ испорченной желчи, находящейся въ желудкѣ и кишкахъ, которую должно стараться вывести сколько возможно скоро: ибо чрезъ законѣннѣе дѣлается она вредительнѣе.

И для того должно дать больному рвотной порошокъ подѣ числѣмъ 26 или 27 предписанный, наблюдая при томъ все то, что предписано въ весеннихъ лихорадкахъ.

Но если у больного будетъ лицо раздуто и красно, глаза наполнены кровью, жаръ сильной по всему тѣлу: то въ такомъ случаѣ нужно прежде рвотнаго пустить кровь.

Если же напрошивъ того будетъ лице блѣдное и сухощавое, и бѣненіе жилъ неполное; то кровопусканіе въ такомъ случаѣ вредно.

Рвотное должно дать больному тогда, когда онъ лихорадки не имѣетъ, или, если она никогда не ошестаетъ, то по крайней мѣрѣ во время послабленія оной.

Иногда также нужно бываетъ повтореніе рвотнаго въ осеннихъ лихорадкахъ, а именно тогда, когда послѣ перваго рвотнаго оцвращеніе отъ пищи и горькость во рту продолжаютъ, и нечистота на языкѣ остается.

Въ тотъ день, въ которой больной рвотнаго не принимаетъ, долженъ онъ много пить предписаннаго подѣ числомъ 25 взвару, примѣшавъ въ оной на каждой фунтѣ по унцу простаго кислаго меду (*oxymel simplex*) подѣ числомъ 31 означеннаго.

Когда больной одинъ или два раза рвотное принялъ: то чрезъ каждые четыре часа можетъ онъ принимать подъ числомъ 32 означенный.

Онъ употребленія таковыхъ средствъ лихорадки обыкновенно умаляются; и если онъ съ начала болѣзни непрерывныя были; то здѣлаются явно перемежающимися, такъ что отъ одного пароксизма до другаго значная бываетъ перемежка.

Въ то время должно дать больному означенный подъ числомъ 29 составъ, наблюдая все то, что предписано о лихорадкахъ весеннихъ.

Пища должна быть тажъ самая, какая употребляется въ весеннихъ тридневныхъ лихорадкахъ. Похлебка лимоннымъ сокомъ, или виннымъ перечищеннымъ камнемъ приправленная, яблоки вареные, груши и хорошо выквашенной хлѣбъ составляютъ главнѣйшую пищу. Когда больной обмогаться станетъ: то къ означенной пищѣ можно присовокупить немного молодой телятины или баранины, также, для большаго подкрѣпленія силъ, можно позволить употреблять понемногу вина.

Но какъ въ осень часъ отъ часу становится студенте: то должно выздоравливающихъ (*reconvalescentes*) предохранять отъ стужи. А безъ того должно не минуемо опасаться опять той же болѣзни.

Сверхъ того должно давать больнымъ выздоравливающимъ чрезъ 14 дней съ ряду по утру на тощакъ и за часъ передъ обѣдой и ужиной предписаннаго подъ числомъ

33 лѣкарства, величиною въ мускатной орѣхъ.

Когда больной уже цѣлой мѣсяцъ былъ безъ лихорадки; то должно дать ему на пощакъ предписанныя подѣ числомъ 34 пилюли, которыя еще послѣ того дать дважды: каждый разъ по прошествіи осми дней.

Если же послѣ рвотнаго и означенныхъ лѣкарствъ лихорадка не покидаетъ, пароксизмъ не умягчается, и больной приходитъ въ безсиліе: то въ семъ случаѣ употребленіе Перуанской корки нужно. Что чаще въ осеннихъ, нежели въ весеннихъ лихорадкахъ, случается.

И такъ должно употреблять означенное подѣ числомъ 30 лѣкарство, такимъ же образомъ, какъ предписано въ весеннихъ лихорадкахъ, и спустя 14 дней паки оное повторить.

Когда глаза желтѣть начинаютъ, больной великую около желудка чувствуетъ тоску, и моча желтой цвѣтъ, какъ въ желтухѣ, имѣетъ: то употребленіе Перуанской корки оставить должно (если только чрезвычайная больного слабость не возпрепятствуетъ), и чрезъ 15 дней съ ряду оной не употреблять, а давать больному чрезъ нѣсколько дней каждые три часа по двѣ ложки означеннаго подѣ числомъ 35 лѣкарства, до тѣхъ поръ, пока упомянутые припадки исчезнутъ. Правда, лихорадка опять возвратится: но понеже больной въ то время, какъ лихорадки не было, съ силами собрался, то оную послѣ удобнѣе снести можетъ, да при томъ она скоро и сама отстанетъ.

Если

Если бы кто въ таковомъ случаѣ Перуанскую корку безпрерывно сталъ давать: то отъ того бы больной впалъ въ долго-временную и неизлѣчимую болѣзнь.

Когда лихорадка Перуанскою корою вылѣчена будетъ: то и не надобно употреб-лять пилюль подъ числомъ 34 означенныхъ, потому что онѣ опять лихорадку произвести могутъ.

Иногда случается, что сей родъ лихора-докъ съ самаго начала съ весьма худыми припадками соединенъ бываетъ: бѣненіе жилъ бываетъ не ровно, лице какъ у мертваго, приключаются частые обмороки, и холодной потъ выходитъ; иные чувствуютъ ненос-ную въ желудкѣ боль, а иные во время са-мага пароксизма впадаютъ въ такъ глубокой сонъ, что едва ихъ разбудить можно.

Въ таковыхъ опасныхъ припадкахъ нужно въ самой скорости давать больному Перуан-скую корку, а иначе онъ слѣдующаго парок-сизма снести не въ состояніи будетъ. И потому долженъ онъ принимать предписан-ное подъ числомъ 30 лѣкарство.

Но если отъ употребленія таковаго сред-ства скоропостижно лихорадка прекратится, и лице у больного здѣлается желто на по-добіе воску, и больной почувствуетъ около желудка великую тоску: то должно ему давать подъ числомъ 35 лѣкарство такимъ образомъ, какъ выше сего предписано было.

О ЛИХОРАДКАХЪ ЧЕТВЕРОДНЕВНЫХЪ.

Во первыхъ примѣчать должно, что въ сихъ лихорадкахъ никогда почти, или весьма рѣдко кровопущаніе нужно.

Должно дать больному передъ пароксизмомъ рвотное подѣ числомъ 26 или 27 находящееся, съ такою предосторожностію, какъ въ весеннихъ лихорадкахъ предписано было.

Предъ наступающимъ пароксизмомъ надобно дать больному слабительной порошокъ подѣ числомъ 28 означенный, поступая при томъ такъ, какъ предписано въ весеннихъ лихорадкахъ.

Потомъ долженъ больной въ то только время, когда лихорадки нѣту, принимать каждые четыре часа предписаннаго подѣ числомъ 36 лѣкарства величиною въ мускатной орѣхъ.


Если лихорадка послѣ осми пароксизмовъ не умалается, и больной приходитъ въ слабость: то должно давать ему Перуанскую кору подѣ числомъ 30 означенную, наблюдая все предписанное о употребленіи сего лѣкарства.

По прошествіи осми дней съ того времени, какъ лихорадка оставитъ, должно еще одинъ разъ повторить то же самое лѣкарство подѣ числомъ 30 означенное; послѣ чего въ четырнадцатъ дней третій и послѣдній разъ оное принять надлежитъ. И такимъ образомъ отвращенъ будетъ вторичной приступъ.

Въ



Въ свободные отъ сей лихорадки дни, можно позволить больному пить вино и бсть побольше нежели какъ въ другихъ лихорадкахъ.



О Ж Е Л Т У Х Ъ.

Когда лихорадка продолжалась чрезъ долгое время, а наипаче осенняя: то случается, что вздухи (hypochondria) становятся тверды и натянуты, и то либо съ неочень чувствительною болью, либо безъ всякой боли; больному послѣ кушанья тошнитъ, а иногда и рвота происходитъ; бѣлокъ въ глазахъ желтѣетъ; моча дѣлается темножелтая, да и вся поверхность тѣла такой же цвѣтъ получаетъ.

Болезнь сія происходитъ обыкновенно отъ худой пищи; и солдаты по большой части оной подвержены бываютъ тогда, когда недостатокъ въ провіантѣ принуждаетъ питаться такою пищею, которая въ желудкѣ сварится скоро и удобно не можетъ.

Больной долженъ принимать чрезъ три часа по четыре ложки предписаннаго подѣ числомъ 35 лѣкарства, и запивать 4 унцами означеннаго подѣ числомъ 37 взвару, которой вездѣ здѣлать удобно можно.

По утру и въ вечеру должно ему давать по полудражмѣ Венеціанскаго мыла въ пилюляхъ.

Должно

Должно при томъ чрезъ четверть часа на пощакъ тереть вздухи на правомъ боку фланелью.

По прошествіи нѣкоторыхъ дней чрезъ употребленіе сихъ лѣкарствъ запоръ въ животѣ уменьшается, и больной испражняться порядочно начинаетъ, и такъ слѣдуетъ облегченіе. Въ прочемъ продолжать должно по же до тѣхъ поръ, когда моча придепѣ къ естественному цвѣту, и желтость въ глазахъ и по всему тѣлу исчезнетъ.

Если отъ вышеупомянутыхъ лѣкарствъ, употребленныхъ чрезъ 6 дней, запоръ въ животѣ нисколько не умягчается: то должно больному по утру принять предписанныя подѣ числомъ 34 пилюли, и не принимать въ тотъ день другихъ лѣкарствъ; а въ слѣдующіе дни опять употреблять прежнія лѣкарства.

Движеніе тѣла таковому больному имѣетъ весьма полезно, а наипаче на свободномъ и чистомъ воздухѣ.

Кромѣ того должно оберегаться отъ опрѣсноровъ или отъ пищи мучной неквашеной; а напротивъ того употреблять похлебки варенныя съ травами, какъ на примѣръ съ жервелемъ, щавелемъ или кислицею, салатомъ и ендивіемъ.

*

*

*



О ВОДЯНОЙ БОЛѢЗНИ.

Когда водяная крови часть собирается и скопляется въ какой нибудь пустой тѣла части великой или малой ; то сія болѣзнь называется *водяною болѣзнію*. Она имѣетъ другія разныя наименованія, въ разсужденіи разныхъ частей тѣла, которыя она занимаетъ.

Если водяная крови часть собирается въ сальной плѣвѣ (*membrana adiposa*), и чрезъ то причиняетъ оная вода по всему тѣлу опухоль: то сія болѣзнь называется у медиковъ *закожная водяная болѣзнь*, (*anasarca*). Опухоль начинается обыкновенно въ нижнихъ частяхъ тѣла, а потомъ нечувствительно разпространяется по всему тѣлу, глаза дѣлаются пасмурные, лице и все тѣло блѣдное и брусكلое, мочи выходятъ немного, и больной никогда не потѣетъ. Если подавишь перстомъ опухоль, то ямка и по отнятіи перста остается. Такія опухлыя части бывають холодны, а больше всего бедра или стегна и ноги.

Болѣзнь сія приключается весьма часто въ арміи послѣ лихорадокъ, которыя чрезъ долгое время продолжались, а наипаче осенью и зимою. Однако и кромѣ того солдатамъ приключается болѣзнь сія, когда они вдругъ напьются много холодной воды, и послѣ лягутъ спать на холодномъ же мѣстѣ: также не рѣдко приходитъ и отъ того, когда много крови изъ человѣка выдетъ либо чрезъ

чрезъ раненныя мѣста, либо чрезъ весьма частое кровопусканіе.

Когда послѣ долговременной лихорадки приключится зажная водяная болѣзнь, то въ такомъ случаѣ не весьма нужны проносныя; а вылѣчиваютъ ее обыкновенно даючи по утру на тощакъ, передъ обѣдомъ за часъ, и передъ ужиною за часъ же, слѣдовательно три раза въ день, по два унца предписаннаго подъ числомъ 38 вина.

Сверхъ того къ совершенному излѣченію требуется, чтобы больной содержалъ себя въ теплотѣ, либо натуральной, либо искусствомъ произведенной; чтобы ночью тепло одѣвался; чтобы питался пищею сухою, какъ на примѣръ жареною говядиною или рыбою; чтобы пилъ мало, чтобы его пищѣ было чистое, и чтобы онъ имѣлъ движеніе равномерное своимъ силамъ.

Весьма полезно тереть опухлыя части фланелью теплою, какъ возможно часто. Если больной мочится побольше, или въ постели своей потѣтъ спанетъ, и опухлыя части припадать будутъ, то такія знаки весьма хорошими почитать должно.

Когда опухоль пропадетъ, то однакожъ разслабленіе въ тѣхъ частяхъ, въ которыхъ она находилась, остается, и подаетъ причину опасаться, чтобы прежняя болѣзнь не возвратилась. Сіе отвратить можно, если оздоравливающей будетъ носить платье уже противу обыкновеннаго, и обвивать спанетъ голени и бедра перевязками (fascia). При чемъ движеніе тѣла на чистомъ и тепломъ воздухѣ необходимо нужно.

Таковымъ образомъ обыкновенно безъ всякой опасности вылѣчивается зажная водяная болѣзнь, которая приключается послѣ лихорадки.

Но когда сія болѣзнь происходитъ отъ другихъ причинъ, то она бываетъ часто непреоборима, и требуетъ великаго количества лѣкарствъ, которыя воду гонятъ.

Многія находятъ къ тому средства, но опыты доказываютъ, что предписанное подъ числомъ 39 лѣкарство есть безвредное и дѣйствительное другихъ. Давать должно онаго больному по утру по ложкѣ. Если послѣ онаго здѣлается рвота, какъ то иногда бываетъ, то въ таковомъ случаѣ не надобно давать больше половины ложки. Но чаще случается, что только тошнитъ послѣ онаго больному. По принятіи сего лѣкарства моча выходитъ въ великомъ количествѣ, и много облегчаетъ больного. Рѣдко случается чтобы сіе лѣкарство слабило; если же сіе и случится, то не должно худыхъ отъ того опасаться слѣдствій.

Употребленіе сего лѣкарства должно продолжаться каждой день до тѣхъ поръ, пока вода выдетъ и тѣло опадетъ совершенно. Если приемъ лѣкарствъ, которое больной употребляетъ, малое имѣетъ дѣйствіе въ крѣпкихъ тѣлахъ, то должно увеличивать оной до тѣхъ поръ, покуда моча начнетъ выходить въ большемъ количествѣ. Во время выздоравливанія должно наблюдать тотъ самый въ пищу порядокъ, и тѣ же самыя предпринимать предосторожности, какъ выше сего упоминаемо было.

Разливъ.

Разлившаяся матерія собирается иногда въ животѣ, и количество оной такъ умножается, что отъ того раздувается животъ чрезвычайно; если сіе случается, то пожавши одною рукою животъ, а другою ударивъ съ противной стороны онаго, можно чувствоватъ колыханіе воды (*fluctuatio*), и чрезъ то познать, что вода по животу разливается.

Когда сія болѣзнь еще не застарѣла; то оную очень часто вылѣчиваютъ однимъ лѣкарствомъ подъ числомъ 39 означеннымъ. Но если чрезъ нѣсколько дней изобильное урины теченіе не возпослѣдуетъ, и опухоль опадать не будетъ: то надобно чрезъ прободеніе живота (*paracentesis abdominis*) выпустить воду.

Операція сія всегда полезна и надежна; если она заблаговременно здѣлана, будетъ: но если она производится въ то время, когда болѣзнь уже застарѣла; то въ таковомъ случаѣ опасна бываетъ.

Наилучше выпускаетъ всю воду однимъ разомъ. И сіе безъ опасенія учинить можно, если только животъ больного повязками съ начала полегоньку, а по томъ покрѣпче, смотря по мѣрѣ вытекающей воды стягивать станешь; чрезъ что обморокъ и другіе худые припадки отвращены будутъ.

Выпустивъ воду, повязки, которыми стянутъ животъ, прикрѣпить должно, и давать больному вышеозначенную пищу.

Употребленіе объявленнаго подъ числомъ 38 лѣкарства въ то время весьма полезно. Иногда животъ опять наполняется и разду-

вається водою. Вб таковомб случаб прободеніе повпорять безб опасности можно.

Но понеже иногда, хопя и рбдко, надуменіе живота не отб собравшейся вб ономб воды, но отб находящихся тамо вбтровб происходитб: для того со всевозможнбйшею исправностію точную надуванія причину разыскивать должно: ибо вб семб случаб прободеніе живота не только не пользуетб; но еще напротивб того смерть ускоряетб.

Болбзнб сія называется вбтреною (tympanites), и разпознается отб водяной брюшной болбзни по нижеслбдующимб знакамб:

1. Рбдко брюхо раздувается, такб сильно отб вбтровб, какб отб водяной болбзни.

2. Вб брюшной опухоли отб вбтровб происходящей брюхо спереди надувается, а по бокамб впадаетб.

3. Когда ударишь по брюху; то вода не болтается, а только опдается звукб какб будто отб барабана.

3. На какую бы сторону больной ни ложился: то всегда надменіе живота одинакую фигуру имбть будетб. Кожа на сей опухоли примбчается ббла, распянута, и лоснится.

5. Запорб и рбзб около пупа часто сію болбзнб предзнаменуютб.

6. Больной спраждаущій водяною болбзнію обыкновенно на вбсахб больше тянетб, нежели вбтрами раздутый.

Вб прочемб вбтрянная болбзнб есть опаснбе нежели водяная, и часто бываетб смертельна.

Однакожб

Однакожь на удачу слѣдующія средства употребить можно: должно тереть животъ два раза въ день по четверти часа нагрѣтою фланелью, а послѣ каждого пренія мазать предписанною подѣ числомъ 40 мазью, и чрезъ нѣсколько дней съ ряду давать больному въ вечеру порошокъ подѣ числомъ 41 означенный.

Если вѣпры начнутъ выходить нижнимъ проходомъ, и на низъ позывать будетъ: то выздоровленія надѣяться можно.


Иногда вода собирается въ груди, и причиняетъ водяную грудную болѣзнь (*hydrops pectoris*). Болѣзнь сія часто приключается отъ того, если солдаты согрѣвшись отъ труда и будучи облиты потомъ, потчасъ на стужу выходятъ, или если въ то же время самой холодной воды съ жадностью напиваются.

Болѣзнь сія познается изъ предвѣдущихъ причинъ, изъ одышки, которая наипаче тогда бываетъ, когда больной засыпаетъ начинаетъ, также изъ сухаго кашля, и изъ того, что больной не можетъ иначе лежать, какъ выставивши впередъ грудь. Въ началѣ сей болѣзни обыкновенно ноги отекаютъ.

Примѣчено, что въ груди больному дѣлается легче, когда отіокъ на ногахъ (*oedema pedum*) умножается явно, и что напротивъ того въ груди становится тяжелѣе, когда такой отіокъ вдругъ исчезаетъ.

Когда сія болѣзнь еще не застарѣла; то легко и щастливо ее вылѣчить можно предписаннымъ подѣ числомъ 39 лѣкарствомъ.

Если же отъ онаго лѣкарства никакого не будетъ успѣха: то не остается другаго средства кромѣ прободенія груди (paracentesis pectoris). Однако сѣе средство не надежно, и изъ опытовъ извѣстно, что оно никогдажелаемаго не имѣетъ успѣха.



О РВОТѢ.

Здѣсь не та разумѣется рвота, которая съ другими болѣзнями, какъ то лихорадкою, колотьемъ въ почкахъ и проч. соединена бываетъ; но та, которая отъ худой пищи либо отъ обремененія желудка происходитъ.

Въ семъ случаѣ наилучшее есть лѣкарство пить много теплой воды для способствованія рвотѣ и очищенію нечистоты.

Если и послѣ сего средства больному тошноется, во рту бываетъ горко, и языкъ клейкою и густою покрытъ мокротою: то надобно дать больному легкое рвотное, какъ наприм: порошокъ подѣ числомъ 27 означенный, поступая при томъ шакъ какъ сказано было въ лихорадкахъ.

Когда рвотной порошокъ дѣйствіе свое окончитъ, и у больного прекратится рвота: то долженъ онъ принимать всякіе три часа по двѣ ложки предписаннаго подѣ числомъ 42 лѣкарства. Такимъ образомъ болѣзнь тотчасъ уймется. Въ томъ же день, въ которой

которой больной принималъ рвотной порошокъ подѣ числомъ 27 означенный, должно ему дать предписанное подѣ числомъ 24 лѣкарство.



О РВОТѢ СЪ ПОНОСОМЪ.

Рвота съ поносомъ (cholera) открывае́тся внезапнымъ и чрезмѣрнымъ исхожде́нiемъ нечистоты верхо́мъ и низомъ.

Хотя болѣзнь сѣя приключи́ться можетъ во всякое время года отъ обремененія желудка и отъ излишества напитковъ: однакожь чаще приходитъ она въ окончаніи лѣта и въ началѣ осени.

Наиболѣе приключается она, если кто вдругъ много лѣтнихъ плодовъ наѣстся, или пьетъ нездоровую и вонючую воду, или новое сладкое вино употребляетъ излишно.

Въ прочемъ болѣзнь сѣя иногда бываетъ столь жестока, что самаго сильнаго человека чрезъ нѣсколько часовъ въ изнеможеніе приводитъ, а чрезъ сутки иногда и умерщвляетъ.

Больной неуполимую жажду и великую тоску имѣетъ; жилы у него бьются скоро, слабо и неравно; потъ выступаетъ холодный; лице походитъ на такое, какое у мертваго бываетъ; и конечности тѣла обыкновенную свою теплоту теряютъ.

Больной чувствуетъ въ рукахъ или въ ногахъ, а иногда вдругъ въ рукахъ и ногахъ боль и судоргу, за которыми слѣдуетъ по

всему тѣлу корченье, а по томѣ и смерть; если въ скорости надежнѣйшія къ излѣченію средства употреблены не будутъ.

Въ сей болѣзни отнюдѣ не должно употреблять ни рвотнаго, ни слабительнаго: ибо сіи лѣкарства, хотя бы они были самыя легкія, здѣсь вредъ причиняютъ: но должно давать больному какъ можно почаще самую жидкую, изъ цыплятъ или пелятины здѣланную похлебку, а за неимѣніемъ оной хлѣбную воду. Должно также больному изъ упомянутой похлебки или хлѣбной воды промывательное спавить, дабы чрезъ то изъ желудка и кишекъ вывести вредную тѣкоть.


Послѣ употребленія чрезъ три либо четыре часа вышеозначенныхъ средствъ, должно давать больному чрезъ всякую половину четверти часа по ложкѣ предписаннаго подѣ числомъ 43 лѣкарства до тѣхъ поръ, пока рвота и поносъ остановятся, или по крайней мѣрѣ значительно умяются.

Когда больной начнетъ чувствовать облегченіе; то давать ему вышеозначенное лѣкарство чрезъ три часа по ложкѣ, и продолжать оное до тѣхъ поръ, пока все изойдетъ.

И хотя послѣ того рвота и поносъ совершенно уже уймутся: однако при всемъ томъ еще должно давать больному чрезъ четыре дни съ ряду по три ложки по утру и въ вечеру лѣкарства подѣ числомъ 43 означеннаго.

Наилучшая въ семъ случаѣ пища похлебка съ пеляшиною и сараѳинскимъ пшеномъ, которой надобно давать въ одинъ разъ понемногу, но часто.

Если больной чрезъ нѣсколько часовъ оставался въ своей болѣзни безъ всякаго врачеванія, и чрезъ сильныя испражненія пришелъ въ слабость; а особливо если уже въ ногахъ и рукахъ имѣеть судоргу съ болью: то въ такомъ случаѣ надлежитъ въ самой скорости употреблять предписанное подъ числомъ 45 лѣкарство, такимъ же образомъ, какъ выше сего сказано было.



О ЛЕГКОМЪ ПОНОСѢ,

или

поносъ безъ чувствительнаго рѣзу.

Если у кого бываетъ чаще обыкновеннаго на низъ, и испражненіе жидкое: то имѣеть поносъ, или мытъ.

Боль и рѣзъ въ животиѣ не велики бываютъ во время сей болѣзни, и тѣмъ самымъ по большей части различествуетъ легкой поносъ отъ тяжелаго, или (какъ другіе называютъ) кроваваго поносу, о которомъ ниже сего сказано будетъ.

Понеже легкій поносъ служитъ иногда къ изверженію худыхъ соковъ: то слѣдовательно оной не всегда вредителенъ: но напротивъ того еще весьма полезнымъ быть можетъ.

Легкой поносъ полезенъ тогда, когда не только силъ въ слабость не приводитъ, но

еще напротивъ того приноситъ нѣкоторое оживленіе онымъ, и больной чувствуетъ отъ того самъ въ себѣ крѣпость: а вредительнымъ онъ тогда бываетъ, когда причиняетъ тягость и слабость.

Простой поносъ, которой съ начала казался бытъ полезнымъ, можетъ здѣлаться также вредительнымъ чрезъ продолженіе; то есть, если онъ чрезъ четыре или пять дней непрестанно продолжается. Ибо тѣло больного чрезъ долговременное испражненіе истощается, и въ изнеможеніе приходитъ, въ кишкахъ внутренняя кожа сдирается, и отъ того слѣдуетъ чувствительная боль и рѣзъ въ животѣ; и такъ напоследокъ легкій поносъ перемѣняется въ тяжелый или кровавый.


Если поносъ пребудетъ лѣченія, то долженъ больной принять порошокъ предписанный подъ числомъ 44, а въ вечеру питье предписанное подъ числомъ 24. Похлебки варенныя съ телятиною и сарацинскимъ пшеномъ, также жидкая молошная кашница съ пшонною крупкою, составляютъ весьма пристойную въ сей болѣзни пищу.

Если поносъ по прошествіи двухъ дней ни мало не унимается, то должно повторить паки употребленіе лѣкарства подъ числомъ 44, и питье подъ числомъ 24, если же еще по прошествіи двухъ дней оной не перестанетъ, то паки оныя лѣкарства принимать должно.

Когда больной выздоравливать и обматываться начнетъ, то весьма полезно, для отвращенія

вращенія вторичнаго припадка давать ему по вечерамъ чрезъ четыре дни катышокъ подъ числомъ 45.

Такъ же смотрѣть должно, чтобы больной хорошо былъ одѣтъ, а наипаче берется бы отъ холоднаго воздуха.



О ТЯЖЕЛОМЪ КРОВАВОМЪ ПОНОСѢ.

Легкій поносъ, будучи чрезъ долгое время безъ всякаго врачеванія съ небреженіемъ оставленъ, часто переимѣняется въ тяжелой или кровавой.

Сверхъ того тяжелой поносъ часто случается самъ отъ себя, хотя съ начала простой или легкой не бываетъ, и усиливается въ арміи по большей части во время лѣтняго зною, и въ началѣ осени.

Тяжелый поносъ есть не что иное, какъ частое испражненіе на низъ, съ чувствительнѣйшею болью и великою рѣзью.

Больной не всегда испражняется съ кровью такъ, какъ многіе врачи думали, которые по той причинѣ и называли его кровавымъ поносомъ.

Однакожъ калъ, который низомъ исходитъ, часто бываетъ нѣсколько красноватый и кровавый, а наипаче когда болѣзнь чрезъ нѣкоторое время продолжалась.

Тяжелый поносъ свирѣпствуетъ въ войскахъ; производятъ же оной слѣдующія причины:

Желчь

Желчь здѣлавшаяся весьма ѣдкою по причинѣ великаго зною и изнеможенія отъ воинскихъ трудовъ, а наипаче когда солдаты разгорѣвшись и испотѣвши на холодномъ, или сыромъ воздухѣ для прохлажденія остается; или обмокши на дождѣ, ложится спать въ мундирѣ. И по тому мы видимъ, что кровавой поносъ часто усиливается въ такихъ мѣстахъ, гдѣ послѣ жаркихъ дней наступаютъ холодныя ночи.

Употребленіе для питья воды болошистой, или на одномъ мѣстѣ стоящей.

Употребленіе въ пищу мяса или рыбы, которыя уже портились начинаютъ, также хлѣба плесневатого, или здѣланнаго изъ гнилой муки.

Достоверныя и многократныя наблюденія доказываютъ, что лѣтніе зрѣлые плоды почти никогда тяжелаго поноса не производятъ: однако неумѣренное оныхъ употребленіе вредъ причинить можетъ.

Болезнь сія отъ вышеупомянутыхъ причинъ произшедши, въ скорости цѣлую армію заражаетъ; исхожденіе гнилыхъ и смрадныхъ паровъ изъ человѣческаго калу заражаетъ здоровыхъ солдатъ, когда они испражняются въ однихъ нужникахъ съ больными.

И по тому для отвращенія сего зла въ то время, когда кровавый поносъ усиливается въ войскахъ, весьма нужно выкапывать глубокія ямы, въ которыхъ бы могли испражняться больные, и зарывать калъ въ оныхъ днемъ многократно, и при томъ имѣть еще особливныя ямы, куда бы одни только здоровые на сторону ходили.

Такъ

Такъ же весьма полезно для прекращенія сея болѣзни, сколько возможно, часто перемѣнять лагерь, и всячески беречься всѣхъ тѣхъ причинъ, о которыхъ выше сказано.

Теперь остается показать способъ, которымъ тяжелый поносъ пользоваться должно.

Если больной будетъ многокровенъ, и если во всемъ тѣлѣ великой жаръ имѣетъ, или горячку, то должно изъ руки пустить крови отъ 8 до 10 унцовъ: однако сіи припадки случаются рѣдко: тяжелый поносъ не всегда соединенъ бываетъ съ горячкою; и кровопущаніе ничего не пользуетъ въ такомъ случаѣ; но тогда долѣетъ только дать больному въ винѣ порошокъ подъ числомъ 46 означенный.

Какъ скоро первый разъ послѣ сего лѣкарства вырветъ; то должно давать ему пить теплую воду, растворивъ въ оной небольшое количество меду: пособіемъ сего питья здѣлается у него новая рвоша, послѣ которой еще должно давать пить ту же воду, продолжая сіе до тѣхъ поръ, пока блевать перестанетъ.

Когда больной по прошествіи послѣдней рвошы чрезъ два часа успокоится, то должно ему дать нѣсколько ломотковъ сухаго хлѣба, омочивъ оные въ четырехъ унцахъ холоднаго винограднаго вина, и посыпавъ для лучшаго вкуса сахаромъ съ корицею. Въ вечеру того же дня должно ему принять предписанную подъ числомъ 47 пилюлю.

На другой день должно повторить тѣ же лѣкарства; и если болѣзнь не пройдетъ, или
по



по крайней мѣрѣ умяляться не будетъ, то еще и на третій день то же самое средство употребить должно.

Но если послѣ двухъ приемовъ вышеупомянутыхъ лѣкарствъ болѣзнь гораздо умяляться станетъ, въ такомъ случаѣ одинъ день спустить должно, прежде нежели больной третей разъ то же самое приметъ.

Изъ опытовъ извѣстно, что также весьма полезно въ сей болѣзни вмѣсто предписаннаго подъ числомъ 46 порошка, дать по утру предписанный подъ числомъ 48, а въ вечеру предписанную подъ числомъ 47 пилюлю. И сіе лѣкарство такъ же, какъ и прежнее до трехъ разъ повторять должно, (спустя одинъ день безъ приему), когда тяжелый поносъ прежде не перестанетъ. Буде предписанное подъ числомъ 48 лѣкарство въ человѣкѣ крѣпкаго сложенія слабо дѣйствіе свое оказывать будетъ, то можно приемъ до 10 или до 12 гранъ умножить. По употребленіи сихъ рвотныхъ лѣкарствъ, долженъ больной нѣсколько дней сряду принимать по утру, въ полдень и въ вечеру по одному золотнику предписаннаго подъ числомъ 49 лѣкарства.

Сверхъ того долженъ больной пить много, а питье для него надлежитъ дѣлать изъ двухъ частей ячнаго или пшоннаго decoctionu, и одной части свѣжаго молока.

Для кушанья варить ему надобно кашницу молочную изъ крупъ ячныхъ, овсяныхъ, пшонныхъ, или изъ сарацинскаго пшена: и когда чрезвычайный кала смрадъ уменьшится, станетъ, въ ту пору можно варить ему похлебку изъ упомянутыхъ крупъ и говядины.

Въ

Въ прочемъ если свирѣпость, или продолженіе болѣзни въ великое изнеможеніе силы приводитъ; то въ такомъ случаѣ рвотныхъ лѣкарствъ употреблять не должно, понеже больной за слабостію оныхъ снести не можетъ.

Что больной находится въ такомъ состояніи, то узнать можно по нестерпимому мученію, которое ему причиняетъ жестокая боль и рѣзъ въ животѣ; такъ же по слабому и зыблющемуся біенію жилъ, по блѣдности и худости лица, по отвращенію отъ всякой пищи, и по неутолимой жаждѣ.

Тогда должно ему давать всякой часъ по одному унцу предписаннаго подѣ числомъ 50 лѣкарства, и при томъ по утру и въ вечеру предписанную подѣ числомъ 47 пилюлю.

Когда худые припадки умяются, а ослабѣвшія силы возобновляться станутъ, тогда давать должно по утру порошокъ предписанный подѣ числомъ 44, а въ вечеру пилюлю предписанную подѣ числомъ 47, и сіе лѣкарство до трехъ разъ повторять должно, спуская между тѣмъ одинъ день безъ приему, если болѣзнь прежде не пройдетъ.

Послѣ долженъ больной чрезъ нѣсколько дней принимать по утру, въ полдень и въ вечеру по одному золотнику предписаннаго подѣ числомъ 49 лѣкарства.

Иногда отъ того, что острая матерія проходя часто чрезъ кишки, внутреннюю кожицу оныхъ разѣла, больной чувствуетъ безпрестанный позывъ на низъ; въ такомъ случаѣ

случаѣ должно ему поставить по утру и въ вечеру промывательное означенное подѣ числомъ 51, и приказать ему задержать оное въ себѣ чрезъ долгое время.

Если по окончаніи испражнений иѣкоторая еще боль останется въ животѣ; то большой великое облегченіе получитъ; буде всякой день по одному сваренному въ смятку яйцу со свѣжимъ коровьимъ масломъ принимать станеть,



О КОЛОТЬѢ ВЪ КИШКАХЪ.

Причины сей весьма опасной болѣзни суть иногда самыя тѣ же, которыя и тяжелый поносъ производятъ.

Знаки, по которымъ узнаютъ болѣзнь въ кишкахъ, суть чувствительнѣйшая боль находящаяся въ животѣ, которая часто увеличивается отъ прикосновенія, напыщеніе или надменіе живота, рвога и запоръ, съ которыми припадками въ одно время сопряжена бываетъ жестокая и непрерывная горячка, неутолимая жажда и чрезмѣрный жаръ; бѣеніе жилъ твердое, моча красная и свѣтлая, и больной скоропостижно въ слабость и изнеможеніе приходитъ.

Когда вышеупомянутые припадки бываютъ сильны; то за ними обыкновенно скоро смерть слѣдуетъ. Предъ концемъ тогда жизни, боль исчезаетъ; но руки и ноги становящіяся холодны и синѣющъ, лице дѣлается такимъ,
какое

какое у мертвыхъ бываетъ, бѣненіе жилъ малое, весьма скорое и неравное. Всѣ сїи знаки предвѣщаютъ приближающуюся смерть, хотя больной и предстоящїи благополучное предзнаменованіе о окончанїи болѣзни отпуща выводятъ.

И пакъ должно въ самой скорости не упуская ни мало времени, много бросить крови; и буде послѣ того боль не пройдетъ, или по крайней мѣрѣ чувствительнѣе не умалится, или хотя и умалишся, однако опять умножатся спанетъ; то паки кровопусканіе повторить можно смѣло.

Кромѣ того должно ставить больному три или чешыре раза въ день промывательное подѣ числомъ 52 предписанное.

Должно такожде суконки обмоченныя въ теплую предписанную подѣ числомъ 12 припарку прикладывать безпрестанно на брюхо. Не менѣе полезно прикладываніе къ животу какое нибудь убитое парное животное.

При томъ должно давать чрезъ полчаса по одной чайной чашкѣ теплаго алкариства подѣ числомъ 53 предписаннаго.

Когда жилы станутъ биться равно, когда боль уменьшишся, когда вѣтры низомъ выходятъ, и когда промывательное съ собою калъ выводитъ; то въ такомъ случаѣ должно имѣть хорошую надежду.

Иногда запоръ въ брюхѣ дѣлается столько сильнымъ, что и многими промывательными преодолѣть оного не можно. Въ такомъ случаѣ табашный дымъ, впущенный внутрь заднимъ проходомъ, весьма хорошее дѣйствіе имѣетъ.

Теплой ячменной декоктъ долженъ служить пишемъ, а жидкія похлебки кушаньемъ до тѣхъ поръ, пока болѣзнь совсѣмъ не пройдетъ, да и по прошествіи прехъ сутокъ не возобновится.

Сверьхъ того томъ, который послѣ болѣзни уже выздоравливаетъ, долженъ наблюдать чрезъ нѣсколько дней легкую и къ варенію способную пищу, опасаясь, чтобы отъ прянаго кушанья не получить паки въ кишкахъ колотья.

Въ прочемъ болѣзнь сія столь свирѣпа, что если она въ скорости пристойнымъ лѣкарствамъ не уступитъ; то немедленно перемѣняется въ смертельный антоновъ огонь. Однако не должно отчаиваться, и оспалять безъ всякой помощи больного; но напротивъ того надлежитъ употребленіе вышеупомянутыхъ средствъ продолжать рачительно и исправно, уповая, что захрясая въ сосудахъ кишечныхъ кровь разойдется.

Если оныя средства употреблены весьма поздно; если болѣзнь чрезъ три или четыре дни продолжалась въ одной степени; если послѣ острой боли находившейся въ животѣ воспослѣдуетъ боль тупая; если при томъ больной чувствуетъ въ ономъ нѣкоторую необыкновенную тяжесть; и если онъ имѣетъ ознобъ ходящій по всему тѣлу; то сіи признаки не ложно доказываютъ, что захрясшая кровь превратилась въ нагноеніе и сдѣлался нарывъ.

Въ такомъ случаѣ должно днемъ безпрестанно припаривать животъ припаркою подъ числомъ 12 предписанною, а къ ночи при-

прикладывать на оное пластырь называемый labdanum.

Иногда кишки прирастаютъ къ брюшинѣ (peritonæum); и тогда сдѣлавшійся въ нихъ нарывъ оказывается съ наружи, (только сіе бываетъ весьма рѣдко); въ такомъ случаѣ должно оной открыть, чтобы гной вытекать могъ свободно.


Когда же такой нарывъ прорвавшись внутри испускаетъ гной въ средину брюха; то весьма худыхъ слѣдствій опасаться должно, если потчасъ оной опять изъ брюха не будетъ выпущенъ. Сіе же учинить весьма трудно; а хотя бы и не трудно было, то однако узнать не легко можно, точно ли гной въ брюхѣ находится или нѣтъ; потому что никогда вдругъ столько гною не истекаетъ, чтобы отъ того опухоль или надуменіе брюха примѣтно было.

Но чаще случается, что гной истекаетъ въ самое дупло кишекъ, и отшуду выходитъ низомъ, что за хорошій знакъ вмѣнять должно. Поэтому когда примѣчено будетъ, что захрясшая кровь въ гной превратилася, то надлежитъ спавитъ больному почаще промывательное подв числомъ 52 означенное, чтобы такимъ образомъ размягчить внутреннюю поверхность кишекъ, и чрезъ то привлечь въ оныя гной.

Въ то время, когда гной одинъ или вмѣстѣ съ каломъ низомъ исходитъ, долженъ больной часто пить предписанный подв числомъ 16 чай, подсладивши медомъ, и при томъ трижды днемъ принять порошокъ, который подв числомъ 18 предписанъ.

Пища для него состоятъ должна изъ мясныхъ похлебокъ, вареныхъ вмѣстѣ съ ендивіемъ, салатомъ, кербелемъ и другими подобными правами. Но таковыя похлебки процѣжены быть должны, чтобы изъ нихъ густой калъ въ кишкахъ не сдѣлался.

Таковой способъ лѣченія продолжать должно до тѣхъ поръ, пока совершенно болячка очистится, и гной весь выдетъ; а о семъ удостовериться можно, когда чрезъ три дни съ ряду на исходящей низомъ нечистотѣ ни мало гною не видно будетъ; послѣ чего можетъ больной опять исподоволь привыкать къ обыкновенной пищѣ.



**О ГОРЯЧКѢ СЪ БЕЗПРЕРЫВНЫМЪ
БРЕДОМЪ, (Phrenitis).**

Когда больной безпрестанно бредитъ, и при томъ жестокую горячку имѣетъ, то сія болѣзнь называется *френизія*.

Такимъ образомъ различается френезія отъ брѣженія, которое иногда случается въ великомъ жару перемежающихся лихорадокъ, и въспѣ съ пароксизмомъ опять проходитъ.

Предвѣщающіе сію болѣзнь припадки обыкновенно суть слѣдующіе: жаръ дѣлается чрезмѣрный, голова болѣе нестерпима, глаза и лице краснѣютъ; больной на вопросы отвѣчаетъ безпорядочно и сурово; и шевелитъ по одѣялу или по воздуху перстами, какъ будто волокны обираетъ.

При-

Причины, отъ которыхъ болѣзнь сѣя по большой части происходитъ, суть солнечной зной, на которомъ солдаты обращаются, а наипаче когда не покрывши головы при солнечномъ сѣянїи спать ложатся, долгое время бдѣніе, чрезмѣрный гнѣвъ, излишнее употребленіе винограднаго, или простаго вина и другихъ крѣпкихъ напитковъ.

Въ сей болѣзни біеніе жилъ обыкновенно бываетъ крѣпкое, а дыханіе великое и не частое.

Френезія есть болѣзнь весьма опасная и часто скоростижную смерть наноситъ; ибо она есть подлинная захряслость крови въ мозговой плѣвѣ; а иногда и въ самомъ мозгѣ.

Когда больной блюетъ зеленью; когда часто харкаетъ и плюетъ; когда отъ знобу содрогается; когда урина у него тонкая, водяная и почти никакого цвѣту не имѣющая; когда судорогою сводитъ ему жилы; когда не имѣетъ никакой жажды; то таковыя припадки худыя слѣдствія предвѣщаютъ. Напротивъ того текуцій мочечуй, поносъ, изобильное кровотеченіе изъ носу облегченіе приносятъ.

Случающаяся въ груди или нижнихъ членахъ боль есть полезна во время сей болѣзни. Иногда сильный кашель приноситъ также облегченіе больному.

Кровопусканіе здѣсь необходимо нужно. Во первыхъ надобно жилу отворить на ногѣ и крови выпустить много; потомъ когда горячка и жаръ не уменьшится, повторить оное другой разъ, отворивъ яремную жилу.

Кровопусканіе повторять должно до тѣхъ поръ, пока чрезмѣрный жаръ не уменьшится, и больной брѣдитъ не переспанетъ. А между тѣмъ какъ больной не спитъ, должно давать ему всякой часъ по чайной чашкѣ теплаго лѣкарства подъ числомъ 54 означеннаго.

Вѣсно обыкновеннаго питія должно давать ему довольно предписаннаго подъ числомъ 35 взвару, а по утру и въ вечеру поставитъ промывательное, которое подъ числомъ 11 предписано.

Если почечуй глухой покажется, то надобно припустить пѣвицъ.

При томъ не худо обрить голову больному, и велѣть ему полоскать часто ротъ теплою водою; также надобно полотенце сложивши въ четверо и обмочивши въ воду смѣшенную по поламъ съ уксусомъ (охусгати), на чело прикладывать; воздухъ свѣжій и умѣренной теплоты весьма приспоинъ, и больной долженъ сколько возможно выше лежать головою.

Весьма также полезно дважды днемъ поднявши больного съ постели, и посадивши на креслахъ, ставить ноги въ теплую воду. Послѣ же того, какъ послѣдній разъ въ вечеру ноги въ воду поставлены будутъ, надобно приложить до утра къ подошвамъ тѣсто подъ числомъ 55 описанное.

Чрезъ все время болѣзни простыми ячными, или овсяными похлебками питаться должно.

Если послѣ употребленія вышеупомянутыхъ лѣкарствъ горячка и брѣженіе станетъ чувствительно умягаться; а больной при томъ спать не будетъ, то въ такомъ случаѣ
можно

можно давать ему въ вечеру миндальное молоко подѣ числомъ 17, примѣшавши полтора унца сиропа изъ бѣлаго маку.

Но пока еще болѣзнь въ одной степени находится, въ то время лѣкарствъ сонъ наводящихъ употреблять не должно.

Въ началѣ сей опасной болѣзни, не упуская времени, должно всѣ вышепоказанныя средства употреблять рачительно; но когда жаръ и брѣженъе гораздо умяются, то кровопусканіе и промывательныя въ то время не очень нужны; а довольно будетъ пить одинъ взваръ подѣ числомъ 25 означенный, и кушанья въ то время побольше позволить можно.

Не рѣдко случается, что и при окончаніи болѣзни брѣженъе продолжается, однако оное ничего худого не значитъ, и само отъ себя нечувствительно проходитъ; а наипаче когда больной еще столько силы имѣетъ, что можетъ часто днемъ посиживать на стулѣ прямо.



О ТЕЧЕНІИ КРОВИ ИЗЪ НОСУ.

(Hæmorrhagia narium).

Понеже кровотеченіе изъ носу случается часто въ горячкахъ, и всегда облегченіе приноситъ больному, а иногда и самѣмъ болѣзнь прекращаетъ: то явствуетъ, что въ таковомъ случаѣ онаго унимать не должно.

Однако теченіе крови изъ носу какъ у больныхъ такъ и у здоровыхъ случается столь сильно, что все тѣло иногда чрезъ то

истощается, и больной въ обморокъ впадаетъ, за которымъ и смерть воспослѣдовать можетъ. Въ шаковомъ случаѣ надобно стараться оное кровотеченіе унять.

А чтобы распознать, когда оное утолять должно, то надобно примѣчать слѣдующее:

Пока примѣтно будетъ довольно полное жилъ біеніе, и пока въ пѣлѣ находится будетъ равномерная теплота даже и въ самыхъ конечностяхъ пѣлесныхъ, т. е. въ рукахъ и ногахъ, такъ же на губахъ и на лицѣ видна будетъ краска; до пѣхъ поръ не должно ничего опасаться, хотя бы и много уже вышло крови.

Если же біеніе крови въ жилахъ начнетъ колебаться, а лице и губы спануть блѣднѣть; тогда должно кровь унять; сіе можно сдѣлать перевязкою рукъ, ногъ и бедръ; ибо чрезъ то крововозвратныя жилы прижимаются, и спремительность текущей къ сердцу крови уменьшается. Когда же такимъ образомъ утолено будетъ кровотеченіе, то не надобно вдругъ отнимать всѣхъ перевязокъ, но каждую четверть часа исподоволь одну за другою развязывать.

Но если симъ средствомъ не унимается кровотеченіе, или если послѣ отнятія перевязокъ, тотчасъ оное опять возобновится; то надобно употреблять слѣдующее средство:

Здѣлавъ изъ корпій свертокъ, и обмокнувъ оной въ вязательное лѣкарство подъ числомъ 56 предписанное, надобно вложить въ ту ноздрю, изъ которой печетъ кровь.

Сіе весьма удобно сдѣлать можно посредствомъ неочиненаго пера, если обвернувъ оное

оное намоченною въ упомянутой водѣ корпѣю вложишь въ ноздрю; однако надобно оное вкладывать горизонтально длиною на полдюйма, послѣ того поднявъ кончикъ пера въ верхъ подвинуть оной слегка сколько можно подалѣ, остерегаясь, чтобы въ ноздрѣ ничего не повредить; потомъ сжавъ всѣ ноздри вытянуть надобно одно перо, а корпѣю оставить въ ноздрѣ на день или на два дни, пока она сама выпадетъ.

Въ прочемъ губка называемая по Латинѣ *agaricus pedis equini figura*, часто благополучно кровь унимаетъ. Можно также съ пользою порошокъ предписачный подъ числомъ 57 вдывать въ носъ посредствомъ пера.



О ГОРЯЧКѢ, или огневицѣ.

Горячка есть такая лихорадка, которая съ начала болѣзни до конца непрерывно продолжается.

Главнѣйшія причины сея болѣзни суть чрезмѣрное движеніе и за нимъ слѣдующее изнеможеніе, а особливо во время лѣшняго зноя; наипаче же когда солдаты принуждены терпѣть чрезвычайную жажду, или когда употребляютъ горячіе напитки.

Ибо жидкія и самыя тонкія части крови чрезъ то теряются, а остатокъ здѣлавшись густымъ и острымъ въ состояніи причинить жестокія, и по большей части горячія болѣзни, потому что вся кровь чрезъ то дѣлается склонною къ загорѣнію.

Если таковая горячка въ какой либо части тѣла причинитъ зажраслость крови или жигучую опухоль: то тогда болѣзнь получаетъ имя отъ зараженной оною части, какъ то колотье въ груди, лигкомъ, горячка съ безпрерывнымъ брѣдомъ, жаба, колотье въ кишкахъ и проч., которыя болѣзни не рѣдко предшествуютъ и горячка бываетъ имъ непремѣнною спутницею.

Буде же таковая горячка происходитъ отъ вышеупомянутыхъ причинъ не причиняя жигучей опухоли въ какой либо части: то въ такомъ случаѣ просто она называется горячкою (*febris continua*).

Горячка сія узнается изъ предвѣдущихъ причинъ, а наипаче, когда больной находится въ совершенныхъ лѣтахъ, горячаго и многокровнаго будетъ сложенія, и бѣеніе жилъ при томъ скорое и твердое (*durus*). Жаръ бываетъ столь сильной, что жженіе онаго чувствовать можно перстами, которыми бѣеніе жилъ извѣдываемъ; моча красная, густая, мутная, языкъ сухой, жажда нестерпимая, боль въ головѣ великая, и дыханіе трудное.

Болѣзнь сія бываетъ больше или меньше опасна, смотря на жестокость вышеупомянутыхъ припадковъ.

Надобно въ самомъ началѣ болѣзни кровь пустить, и сіе повторять до тѣхъ поръ, пока сильной жаръ и сухость языка начнутъ умягчаться.

Ячной взваръ для всегдашняго питія при-
стоемъ, только на каждой фунтѣ онаго
должно прибавить одинъ унцъ предписаннаго
подъ числомъ 31 лѣкарства. Чрезъ каждые
два

два часа надобно давать больному по чайной чашкѣ означеннаго подѣ числомъ 54 лѣкарства. Два раза въ день должно ставить промывательное подѣ числомъ 11 предписанное.

Такимъ образомъ поступать надобно до тѣхъ поръ, пока болѣзнь утихнетъ, что можно узнать изъ уменьшившагося жару и ослабѣвшаго бѣенія жилъ, изъ умаленія жажды, и умноженія во рту и на языкѣ мокроты; также и изъ того, когда моча будетъ уже не столь красна и начнетъ въ ней дѣлаться осадка.

Въ разсужденіи діетъ то же самое надобно наблюдать, что предписано въ колошѣ.

Когда болѣзнь уменьшаться станетъ: то довлѣетъ больному давать пить взваръ подѣ числомъ 25 означенный; и можно ему прибавлять исподоволь и пищи, пока совершенно выздоровѣетъ.

При семъ надобно примѣчать, что есть еще другой родъ горячки, которая не отъ возжигательной густоты крови, но отъ зардлившейся въ сокахъ гнилости и разрѣшенія происходитъ. Таковая горячка есть гораздо хуже и опаснѣе, нежели первая. Она также весьма часто бываетъ заразительна и прилипчива.

Сія приключается по большей части когда армія во время лѣтняго зною расположится на болотистомъ мѣстѣ, гдѣ обыкновенно воздухъ наполненъ бываетъ гнилыми парами. Наипаче же оказывается тогда, когда въ тѣсномъ какомъ либо мѣстѣ, въ которомъ воздухъ не можетъ очищаться, народъ

народъ принужденъ жить въ многолюдствѣ. На военныхъ корабляхъ и въ больницахъ, гдѣ обыкновенно много больныхъ и раненыхъ въ одномъ мѣстѣ бываетъ, она часто случается, а особливо если тамъ воздуха перемѣнять и обновлять не можно. Ибо парами отъ больныхъ исходящими, срадомъ кала и гнило-спію раненыхъ часней, воздухъ, которымъ ежеминутно дышутъ, заражается, и отъ того происходитъ весьма худая и совершенно гнилая горячка, которая скоро потомъ дѣлается заразительною и прилипчивою. И для того она называется госпитальною и темничною, она имѣетъ собственные свои припадки, которые должно здѣсь обстоятельно описать, чтобы можно было хорошо разпознать сію пагубную болѣзнь.

Она начинается ознобомъ, за которымъ слѣдуетъ скоропреходящій жаръ, и опять возвращается ознобъ, а послѣ паки дѣлается жаръ, и такъ часто жаръ и ознобъ появляются, и отстаютъ попеременно. Позываніе на пищу совсѣмъ исчезаетъ, сонъ бываетъ безпокойной и силамъ не приноситъ никакова возобновленія (non reficiens); въ челѣ чувствуетъ больной великую тяжесть; біеніе жилъ находится въ такомъ почти порядкѣ какъ и у здороваго человѣка; поверхность тѣла рѣдко бываетъ сухая, и по большей части имѣетъ она обыкновенную мягкость и влажность: больной хотя за слабостію и не въ состояніи бываетъ опправлять свою должность, однако при всемъ томъ чрезъ нѣсколько дней похаживаетъ и не такъ скоро сляжетъ въ постель;
азмкб

языкъ у него по большей части мягкой, влажной, и корою изъ желта зеленоватою покрытый; больного клонитъ ко сну, однако онъ долго спать не можетъ; и кажется что онъ въ глубокихъ размышленіяхъ находится. Когда усиливается болѣзнь: то руки начинаютъ дрожать, слухъ отнимается, голосъ ослабѣваетъ; біеніе часъ отъ часу приходитъ въ изнеможеніе, и тогда больной проситъ крѣпительныхъ лѣкарствъ и вина. Къ ночи всѣ сіи припадки ожесточаются; на концѣ появляются пятна пурпуроваго цвѣту и неопредѣленнаго очертанія (petechiæ) ранѣ или позже такъ что извѣстнаго дня опредѣлить не можно.

Когда силы внезапно оскудѣваютъ, и зрѣніе помрачается; когда больной всегда на спинѣ только лежитъ, колѣна въ верхъ поднимаетъ, и часто встать покушается; когда во рту черные пупырышки (arthritis nigra), а по всему тѣлу черныя пятна, и изъ черна синевапыя полосы покажутся; когда при томъ больной испускаетъ изъ себя много калу, который имѣетъ цвѣтъ черной или свинцу подобный, и чрезъ то больше еще изтощевается и ослабѣваетъ: тогда ничего больше какъ смерти ожидать не можно.

Глухоту (surditas) въ сей болѣзни не весьма худымъ знакомъ почитать должно. Часто примѣчено, что выздоравливающіе худо слышатъ, и иногда въ слыхательномъ проходѣ (meatus auditorius) имѣютъ нарывъ.

Когда желчная маперія низомъ выходитъ; когда моча густая и языкъ мокрой будетъ: тогда



тогда хорошую надежду имѣть должно; а особливо когда при томъ и силы не истощаются.

Многочисленные красные бугорки или также и бѣловатые, пшену подобные, пупырышки, (miliare) ничего худого не предзнаменуютъ, и особливо если у больного свободно харкотина выходитъ, и моча имѣетъ густую осадку. Хорошую надежду можно еще имѣть и тогда, когда воспослѣдуетъ невеликой и облегчающей потъ; когда околоушныя желѣзы (parotides) распухаютъ; или когда въ горлѣ маленькіе бѣлые пупырышки выступаютъ.

Понеже вышереченныя причины и припадки сей болѣзни показываютъ, что вся кровь въ гнилость приходитъ; и понеже силы весьма истощаются: для того здѣсь кровопущаніе не имѣетъ мѣста, выключая многокровныхъ, но и такимъ болѣе одного раза кидать крови не надобно: ибо примѣчено, что избытокныя кровопущанія вдругъ лишаютъ силъ и причиняютъ брѣдъ.

Необходимо потребно въ сей болѣзни часто возобновлять воздухъ.

Если больному тошнитъ, если онъ въ желудкѣ чувствуетъ тяжесть и тоску; если языкъ покрытъ будетъ изъ желта зеленоватую корою: то надобно дать ему рвотной порошокъ подъ числомъ 27 предписанный. Какъ скоро вырветъ больного первой разъ, то долженъ онъ пить теплую воду до тѣхъ поръ, пока рвота перестанетъ, какъ о семъ выше въ лѣченіи лихорадокъ упомянуто.


Въ тотъ же самый день, когда больной приметъ рвотное, долженъ онъ еще въ вечеру принять каплишекъ подѣ числомъ 58 предписанный, и выпить потомъ шесть унцовъ сыворотки подѣ числомъ 59 означенной. Если же не лзя достать такой сыворотки: то вмѣсто ее можно употреблять взваръ подѣ числомъ 25 предписанный, примѣшавъ къ оному на каждый фунтъ два унца винограднаго вина и полбунца варенаго съ уксусомъ меду. Упомянутая сыворотка и взваръ могутъ больнымъ служить вмѣсто обыкновеннаго пищи, тѣмъ паче, что сами они желаютъ крѣпительныхъ лѣкарствъ и вина, да и болѣзнь того же требуетъ.

Каждые шесть часовъ долженъ больной принимать порошокъ подѣ числомъ 60 предписанный, и запивать оной шестью унцами вышеупомянутой сыворотки или взвару.

Когда больной въ крайнее изнеможеніе придетъ; когда пурпуровыя пѣтна исчезнутъ или пшену подобные пупырышки во внутрь входить станутъ: то тотъ часъ воспослѣдуетъ великая поска, судорга, и потомъ смерть. Въ такихъ обстоятельствахъ должно давать больному одну полную ложку предписаннаго подѣ числомъ 61 лѣкарства, и каждый разъ велѣтъ запивать шестью унцами вышеупомянутой сыворотки или взвару съ виномъ. Сіе до тѣхъ поръ надобно продолжать, пока больной почувствуетъ облегченіе, пурпуровыя пѣтна опять выступятъ и пупырышки пшену подобные опять подниматься станутъ. Потомъ надобно давать по одной только ложкѣ сего лѣкарства каждые четыре

четыре часа. Легкой и по всему шѣлу равно-
мѣрной потѣ, который за симъ обыкновенно
слѣдуетъ, есть весьма полезенъ.

Если во время сея болѣзни здѣлается за-
порѣ, то надобно больному употребить про-
мывательное подѣ числомъ 52 предписанное.
Какъ скоро таковымъ больнымъ лучше здѣ-
лается, то должно ихъ вывести изъ сей
больницы, чтобъ они могли пользоваться
свѣжимъ воздухомъ; а иначе весьма удобно
могутъ они впасть въ прежнюю болѣзнь, и
умрутъ.



О ЦЫНГОТНОЙ БОЛѢЗНИ.

Бо́лѣзнь сѣя не рѣдко приключается, и лѣ-
чить ее пѣрудно, а особливо въ осажден-
ныхъ городахъ и въ нездоровыхъ и болоти-
стыхъ мѣстахъ, гдѣ солдаты иногда зимо-
вать принуждены бывають.

Начинается болѣзнь сія съ необыкновенною
отягощенностію и слабостію во всемъ тѣлѣ:
больные послѣ сна чувствуютъ такую сла-
бость во всѣхъ своихъ членахъ и мышцахъ,
что кажется будто оныя раздавлены.

Когда увеличивается сія болѣзнь, то больной чувствуетъ тяжелую одышку, ноги отекаютъ, лице съ начала блѣдное, а потомъ синеватое становится; на шѣлѣ показыва- ются разноцвѣтныя пятна, изъ рта исхо- дитъ смрадной духъ, зубы начинаютъ шата- ться, десны пухнутъ, портятся, причи- няютъ боль, и опъ малѣйшаго прикосновенія высту-

выступаетъ изъ нѣхъ кровь: больной чувствуетъ по всему тѣлу великую боль, которая съ мѣста на мѣсто переходитъ.

Наконецъ когда болѣзнь приходитъ еще въ худшее состояніе: то согниваютъ десны и воняютъ нестерпимо; зубы желтѣютъ, чернѣютъ, и отъ гнилости сбѣдаются; приключаются часто великія кровотеченія; дѣлаются весьма худыя раны, а особливо на ногахъ; больной жалуется что онъ чувствуетъ боль, которая какъ будто спрѣляется по всему тѣлу, и къ ночи сильнѣе становится; напослѣдокъ повсюду появляющіяся изъ черна синія пятна.

Когда болѣзнь до такой степени придетъ: тогда часъ отъ часу больному хуже дѣлается; приступаютъ къ нему различныя горячки; все тѣло его гнѣетъ; часто приключаются смертельныя кровотеченія ртомъ, носомъ и низомъ; внутренности портятся; больной впадаетъ въ обморокъ и умираетъ.

Первѣйшія причины какъ въ арміи, такъ и на зимнихъ квартирахъ суть слѣдующія: мокрая и болотистыя мѣста вредными парами наполненныя; недостатокъ движенія, скудость въ зелени употребляемой въ пищу, употребленіе въ питье испорченной и вонючей воды, а въ пищу копченago и соленого мяса и рыбы или давняго гнилаго сыру, такъ же сырость въ низкихъ избахъ, въ которыя вѣтеръ не проходитъ.

Примѣчено что всегдашняя печаль и страхъ также могутъ произвести сію болѣзнь и въ такомъ человѣкѣ, которой въ прочемъ будетъ здоровъ, или оную умножить, когда



она въ комѣ уже зарождена: по сей то причинѣ солдаты въ осажденныхъ городахъ отъ сей болѣзни очень часто погибаютъ.

Чрезъ всегдашнія наблюденія извѣдано, что въ сей болѣзни дѣлается загустѣніе крови, соединенное съ гнилою оспрою (*asrimonia putrida*).

Поному для излѣченія сей болѣзни надобно сперва разжидить густоту и клейкость соковъ, и не допустить ихъ къ гнилости, или если оною уже кровь заражена, то стараться ее поправить.

Надлежитъ такъ же отвращать всѣ причины сея болѣзни, или буде того не возможно излѣчить, то по крайней мѣрѣ оныя исправлять сколько возможно и отвращать; чрезъ что солдаты отъ сей болѣзни предохранены быть могутъ.

Во первыхъ стараніе приложить должно, что бы поправить нездоровую кровь. Если два унца уксусу, и два унца простаго вина смѣшать съ одною кружкою воды, то она для солдатъ будетъ приятна и здорова.

Если же въ готовности не будетъ довольно уксусу и простаго вина, то можно въ воду положить нѣсколько корня называемаго ира (*salatus aromaticus*); сей корень вездѣ находится, и растетъ обыкновенно въ великомъ множествѣ по мокрымъ и болотистымъ мѣстамъ, гдѣ чаще сія болѣзнь свирѣпствуетъ.

Крѣпкія проносныя и рвотныя лѣкарства, равномерно какъ и кровопущаніе, въ сей болѣзни ни мало не годятся.

Однако поелику худая пища очень часто причиняетъ цынгу, то и не бесполезно въ такомъ



такомъ случаѣ будетъ выгнать изъ желудка и кишекъ скопившуюся нечистоту. Сіе можно здѣлать посредствомъ легкихъ и часто повторенныхъ слабительныхъ.

И такъ долженъ больной по утру принять пилюли, подѣ числомъ 34 предписанныя, которыя еще потомъ дать ему два раза, но всегда черезъ день.

Кушанье должно состоять изъ однихъ похлебокъ вареныхъ съ хервелемъ, щавелемъ, шпинатомъ, салатомъ, ендивіею, цикоріею, калустою, а особливо красною и съ молодою кроливою. Изъ всѣхъ сихъ или другихъ имъ подобныхъ травъ, избирать должно тѣ, которыя наиудобнѣе достать можно.

Хорошіе и зрѣлые плоды въ такомъ случаѣ никакъ не вредны, если оныя умеренно употреблены будутъ.

Будежъ оныхъ травъ или плодовъ сыскать не можно, то надобно давать больнымъ похлебку изъ овсяной крупы или изъ сарацинскаго пшена здѣланную.

Можно имъ такъ же позволить ѣсть курицъ или теляшину, только бы не много наѣдались за однимъ разомъ.

Когда больной принялъ легкія слабительныя, то надобно ему послѣ того давать лѣкарства противу цынготныя (antiscorbutica). Но поелику больные не всѣ одно имѣютъ свойство и природу, для того можно каждому изъ нихъ давать особое лѣкарство, смотря по различію ихъ сложенія.

Если больной будетъ холоднаго сложенія, на лицѣ блѣденъ, жажды великой не имѣетъ и ноги будутъ распухши: то по утру и въ вечеру



вечеру всегда по два унца, т. е. по чайной чашкѣ лѣкарства, подѣ числомъ 52 предписаннаго, принимать долженъ.

Если же больной имѣетъ жаръ, бѣшеніе жилъ скорое, жажду великую, дыханіе смрадное, десны кровавыя и почти сгнившія: то надобно ему по утру и въ вечеру давать по четыре унца предписаннаго подѣ числомъ 63 лѣкарства.

Для таковыхъ больныхъ весьма полезно употреблять хорошіе зрѣлые лѣтніе плоды. Варенные яблоки и груши суть такожде въ семъ случаѣ весьма здоровы, и довольное число оныхъ вездѣ сыскать можно.

Употребленіе таковыхъ лѣкарствъ надобно продолжать чрезъ долгое время. Когда больной своими членами способнѣе дѣйствовать и боль уменьшаться станетъ: то изъ сего заключить можно, что ему легче становится; и тогда тѣлодвиженіе и хорошая пища совершенное здравіе возстановить могутъ.

Для истребленія и самыхъ малѣйшихъ остатковъ болѣзни, не бесполезно будетъ велѣть выздоравливающимъ больнымъ по утру передъ обѣдомъ и въ вечеру принимать по пятидесяти капель, подѣ числомъ 64 предписанныхъ, въ винѣ по поламъ съ водою растворенномъ.

Хотя послѣ излѣченія всякой болѣзни, исчезаютъ и всѣ припадки, однако примѣчено, что послѣ истребленія цынготной болѣзни скоро десны опять распухаютъ, на губахъ и на внутренней поверхности щекъ и неба дѣлаются раны, которыя тотчасъ повсюду распро-

распространяся, всѣ части сбѣдаютъ и въ антоновъ огонь превращаются: таковыя нарывы часто обманываютъ тѣхъ, кои не довольно еще имѣли опытовъ въ лѣченіи: сначала показывающія бѣлыя, или желтыя пятна въ округъ зардѣвшія, съ болью соединенныя; примѣтно такъ же бываетъ великой сирадъ изо рта, и вонючей слюны много ишекаетъ.

Сіи припадки потчасъ надобно истребить, а инако опасная сія гнилость всѣ части заразитъ, зубы всѣ выпадутъ, и самая гортань повредится и сгніетъ.

Сіе весьма щасливо излѣчивается, если корпіею въ сокъ подъ числомъ 65 предписанномъ обмоча почаще днемъ помазывать спанешъ поврежденные части: можно сію корпію въ томъ же сокѣ намоченную класъ промежъ зубовъ и губъ, и оную часто переимѣнять.

Нѣкоторые приобыкли больныя части крѣлко тереть; однако сіе вредно, боль чрезъ то умножается, и самая болѣзнь усиливается.

Если усмотрѣна будетъ великая гнилость, и если раны скоропостижно распространяющіяся, то надобно потчасъ къ означенному подъ числомъ 65 соку примѣшать кислоты поваренной соли (spiritus salis), и оной употреблять пока не пройдетъ антоновъ огонь.

*

*

*

ОБЪ АНТОНОВОМЪ ОГНѢ (gangræna).

Понеже объ антоновомъ огнѢ передъ симъ упомянуто было, то не бесполезно кажется, будетъ здѣсь предложить, что перувіанская кора (cortex peruvianus) внутрь принятая есть найдѣйствительнѣйшее средство для прекращенія во всѣхъ частяхъ антоноваго огня: надобно всегда черезъ чепыре часа давать одинъ порошокъ, подъ числомъ 30 предписанный, до тѣхъ поръ, пока антоновъ огонь начнетъ отдѣляться отъ живыхъ и здоровыхъ частей, и превращаться въ совершенное нагноеніе. Въ то время довольно уже будетъ, если больной поутру и въ вечеру одинъ такой порошокъ станетъ принимать, пока нарывъ совершенно очистится.

Потому оную корку можно употреблять и въ такомъ случаѣ, если цынготные нарывы антоновымъ огнемъ зараженные въ роту подѣлаются.



О ФРАНЦУЗСКОЙ БОЛѢЗНИ.

Причина французской болѣзни состоитъ всегда въ заразѣ, которая бываетъ чрезъ совокупленіе одной osoby здоровой съ другою, подверженною уже сей болѣзни.

Зараза сія производитъ многоразличные припадки въ разсужденіи разныхъ частей тѣла, которыя она занимаетъ, и слѣдовательно имѣетъ различныя наименованія.

Если

Если на конечности плоти или на залупѣ здѣлаются ранки: то онѣ называются шанкры отъ Французскаго слова *chancres*; если же на какой нибудь части изъ дѣшородныхъ здѣлаются бугорки на подобіе бородавокъ: то они называются тогда по Французски *porreaux*: а если на внутренней мочеиспускательнаго канала или стволу поверхности здѣлается какая нибудь рана, и отъ того воспослѣдуетъ боль и препятствіе въ изпусканіи мочи; тогда называется сія болѣзнь по Гречески *stranguria*: если же отшуду будетъ печь гной или желтой, или зеленоватый, или сѣрой; тогда сей припадокъ называется бѣлая грыжа (*gonorrhoea*): если здѣлаются опухоли въ пахахъ; тогда сія болѣзнь называется бубонъ (*bubo*): но когда нечислота французской болѣзни примѣсится крови такъ, что съ нею кругомъ бращаться станетъ по всѣмъ частямъ тѣла; то отшуду произойдутъ новые много-различныя припадки, а именно: пупыря гноеватые и пятна дѣлаются на поверхности кожи, которые иногда покрываются какъ будто скорлупою на подобіе мозолей; раны больше въ ширину нежели въ глубину распространяются, то есть мѣсто свое занимаютъ въ оболочкѣ, которая подъ самую кожу находится, и въ которой натурально жиръ содержится. Противу таковыхъ ранъ никакія лѣкарства приспѣшныя ранамъ другаго роду, недѣйствительны. Онѣ разбѣвши сіе мѣсто оставляютъ по себѣ рубцы (*cicatrices*), на которые посмотришь гнусно и когда они зашворяются, то на другомъ мѣстѣ въ близости дѣлаются.



Отъ сей болѣзни весьма часто раны дѣлаются въ гортани и на нѣобной завѣсѣ отъ мала по малу. Тогда показывается на сихъ частяхъ пятно подобное нѣскольکو пуку; голосъ дѣлается сипкой, глотать больно, и нѣпно, о которомъ недавно упомянуто, распространяясь больше и больше день отъ дня заражаетъ мягкія части, а послѣ и кости нѣобныя и носовыя, которыя отъ того гнить начинаютъ, и наводятъ безобразіе до конца жизни, никакимъ средствомъ неисцѣлимое.

Болѣзнь сія, а наипаче застарѣлая, производитъ ломоту въ костяхъ, и причиняетъ опухоли въ оныхъ, которыя если будутъ мягки, то называются по Ламыни torhi или gummi: если же будутъ тверды, то называются exostoses, въ которыхъ заражается гниль и нестерпимая боль, наипаче ночью и на теплой постелѣ умножается.

Когда кости и мозгъ въ костяхъ гнить начнутъ: то исцѣленіе сей болѣзни весьма трудно бываетъ: и хотя иногда кажется быть исцѣленна; однако сѣизнова приходитъ.

Изъ всѣхъ сихъ припадковъ французскую болѣзнь удобно узнать не трудно.

А лѣчить ее можно безъ всякой опасности слѣдующимъ образомъ:

Больному по утру и въ вечеру давать по ложкѣ лѣкарства предписаннаго подъ числомъ 66 и запивать по фунту ячменнаго отвара, въ который можно прибавить третью часть молока: сей самой отваръ съ молокомъ смѣшанной можетъ служить также вмѣсто обыкновеннаго питья. А если молока достать не

не можно будетъ: то въсто онаго взвару употреблять должно предписанной подв числомъ 67.

Лѣкарство сѣе не наводитъ никакого безпокойствія больному: оно у нѣкоторыхъ слабѣтъ на низъ, только рѣдко; у нѣкоторыхъ гонитъ мочу, а у нѣкоторыхъ дѣйствуетъ чрезъ потъ. Но при всемъ томъ употребленіе лѣкарства можно продолжать безъ всякой опасности до тѣхъ поръ, пока всѣ припадки французской болѣзни не исчезнутъ.

Если погода ясная и воздухъ благорастворенный; тогда больной и выходить можетъ: а во время холодной и мокрой лучше ему дома оставаться.

Если покажется, что лѣкарство дѣйствіе свое слабо производитъ; и больной при томъ сложенія въ прочемъ здороваго будетъ; а болѣзнь застарѣлая: то можно приемъ умножать до полуторы ложки по утру и въ вечеру. Если же и то чрезъ нѣсколько дней употребленное не въ состояніи будетъ уменьшать припадковъ: то можно давать больному по утру и въ вечеру на одинъ приемъ по двѣ ложки, и такъ всякой день по четьре ложки.

Какъ долго сѣе лѣкарство больному давать надобно, на то времени назначить и опредѣлить не можно. Слѣдовательно когда болѣзнь еще не гораздо усилилась; то можно ее вылѣчить въ три недѣли: а если она застарѣла, то и лѣченіе больше продлится. То только извѣстно, что сѣе лѣкарство чрезъ долгое время безъ всякой опасности употреблять можно.

Когда раны начнутъ заживатьъ; когда испорченная костей часть отдѣлится отъ здоровой и отпадетъ; и когда опухоли упадутъ станутъ; также и ломота бывающая по ночамъ умалится: то извѣстно уже, что лѣкарство болѣзнь препобѣждаетъ.

Что касается до діеты: то въ семъ случаѣ похлебка изъ ячнхъ крупъ, изъ овсяныхъ, изъ сарацинскаго пшена, или мягкихъ травъ, мясо нежирное, молоко и созрѣлые плоды пристойны.

Мясо жирное и копченое или соленое есть вредительно, а паче всего сало.

При томъ должно примѣчать слѣдующее. Иногда послѣ вышеупомянутаго лѣкарства дѣлается теченіе слюны (salivatio): но сіе случается рѣдко, и то единственно у тѣхъ, которые прежде либо внутрь принимали, либо съ наружи употребляли ртуть. Но понеже теченіе слюны не нужно къ излѣченію: то въ то же самое время, какъ скоро первые знаки теченія слюны покажутся, должно оставить лѣкарство предписанное подъ числомъ 66, а между тѣмъ продолжать взваръ подъ числомъ 67 предписанный.


Знаки же, по которымъ наступающее теченіе слюны узнать можно суть слѣдующіе:

Десны начинаютъ пухнуть, рдѣютъ, глотаніе становится трудное, и духъ изъ рта прошивной выходитъ. Какъ скоро сіи припадки окажутся: то тотчасъ должно, какъ уже выше сказано, лѣкарство предписанное подъ числомъ 66 оставить. Но можно оное будетъ опять начать, если по прошествіи

Если больной имѣетъ сѣмени теченіе (gynorrhoea): то долженъ онъ пить много взвару предписаннаго подѣ числомъ 67, чтобы чрезъ то притупить остроту урины. Сверхъ того весьма полезно будетъ парить студный членъ три раза въ день, а всякой разѣ по четверти часа, въ молоко смѣшанномъ по поламъ съ водою.

Если чрезъ остановленіе теченія сѣмени или отъ другихъ причинъ одно яйцо распужнетъ, и начнетъ ломить; и мешонка рдѣть станетъ: то надобно тотчасъ много пустить крови, потомъ припаривать опух- лое яйцо предписанною подѣ числомъ 12 при- паркою, и давать больному пить довольно предписаннаго подѣ числомъ 1 взвару, приба- вивши въ оной на каждой фунтѣ 20 гранъ чистой селитры. А когда яйцо перестанетъ рдѣть и болѣть, также и горячка, которая часто вмѣстѣ приключается, пройдетъ: то можно употреблять тогда предписанное подѣ числомъ 66 лѣкарство.

Что касается до такъ называемыхъ бубновъ (bubo): то, если они бывають весьма тверды, можно къ нимъ прикладывать пластырь называемый (emplastrum galbani).



Бо́лѣзнь сѣя часто великое безпокойствіе на-
носитъ въ арміи, и дѣлается весьма за-
разительною, а наипаче когда болящіе ею
съ здоровыми вмѣстѣ обращеніе имѣютъ.

Хотя

Хотя всѣ наружныя тѣла части могутъ быть заражены чесоткою: однако она обыкновенно съ начала оказывается на рукахъ, а наипаче между пальцами. Съ самаго начала выступаютъ одинъ или два пузырька, нѣкоторою прозрачною мокротою наполненные, и производятъ весьма безпокойной зудъ. Если сіи пузырьки чешучи раздарапать: то содержащаяся въ оныхъ вода сообщаетъ болѣзнь частямъ совмѣстнымъ. Съ начала сей болѣзни и признать не можно; если не имѣть объ оной совершеннаго свѣдѣнія: но со временемъ пупыришки умножаются числомъ и величиною. Когда больной раздарапаетъ ихъ чешучи: то послѣ покрываются они какъ будто корою, и чесотка распространяется по всей поверхности тѣла.

Съ начала чесотка мѣсто свое имѣетъ между кожицею (cuticula) и кожею (cutis): если же она чрезъ долгое время продолжаясь усиливается: то проходитъ сквозь кожу до клетчатой сѣтки или до жирной перелонки (tela cellulosa f. paniculus adiposus), и дѣлаетъ тамъ маленькія, но часто многочисленныя ранки. Сей родъ чесотки хуже другаго, и при томъ весьма прилипчивъ.

Лѣчить сію болѣзнь должно слѣдующимъ образомъ:

Надобно наблюдать чистоту тѣла, и перемѣнять часто рубаху. Если погода будетъ хорошая, и если къ тому будетъ случай, то надобно мыться въ водѣ, которая смѣщена съ сѣрою. Если сего учинить не лзя: то весьма полезно, какъ примѣчено, купаться лѣщомъ въ текущей водѣ. Должно также

также накуривать сѣрою рубахи, штаны и чулки, прежде нежели оныя надѣвать. Но сѣ дѣлать надобно на свободномъ воздухѣ, чтобы сѣрной духъ не повредилъ дыханія.

Больной долженъ по утру на пощакѣ принять проносной порошокъ, предписанный подѣ числомъ 68, и повторить приемъ по прошествіи осми дней.

А между тѣмъ въ прочіе дни давать ему три раза въ день, то есть по утру, въ полдень и въ вечеру одинъ изъ порошковъ, предписанныхъ подѣ числомъ 69.

И при томъ мазать всякой день по вечерамъ зараженныя части предписанною подѣ числомъ 70 мазью.

Когда чесотка находится по всему тѣлу; то не надобно мазать вдругъ туловища и членовъ: но сперва вымазать только руки, на другой день ноги, а на третей день туловище, въ четвертый день опять снова помазать руки, въ пятый день ноги, а въ шестой день туловище, и такъ далѣ до тѣхъ поръ, пока больной не вылѣчится совершенно.

Когда пузыри подсохнутъ, и опрутъ оппадетъ, и ранки закроются, и вновь показываться не будутъ: то заключить можно, что больной вылѣчился.

Правда, что по излѣченіи видны бывають еще нѣкоторыя пятна на кожѣ: однако сіи знаки со временемъ сами исчезаютъ.

Больной во время лѣченія долженъ воздержаться отъ соленой пищи.

✱

✱

✱



О ГЛИСТАХЪ.

Солдаты часто больны бываютъ глистами, которыя рождаются отъ худой пищи, нездоровыхъ водъ, и многихъ другихъ причинъ. Обмороки, посклиivosti, вдругъ происходящее напыщеніе брюха, а особливо послѣ употребленія пищи, изгага, ворчанье въ брюхѣ, безпокойный въ носу свербежъ, суть знаки находящихся глистовъ. У нѣкоторыхъ позывъ на стулъ бываетъ чрезвычайный; а у нѣкоторыхъ совсѣмъ оной пропадаетъ. Лице бываетъ блѣдное и обрюсглое.

Однако всѣ вышеупомянутые знаки не во всякомъ больномъ вдругъ примѣтить можно. Но чѣмъ больше оныхъ мы примѣчаемъ: тѣмъ больше удостовѣрены бываемъ, что находятся глисты.

Всѣхъ знаковъ извѣстїе будетъ, когда глисты у больного выходятъ верхомъ или низомъ.

Лѣченіе состоитъ только въ томъ, чтобы оныя выгнать изъ пѣла; однако сіе учинить не очень удобно: понеже примѣчено, что глисты какъ будто прикрѣплены къ кишкамъ. А иначе бы они выходить могли съ каломъ вмѣстѣ.


Но дабы возвѣстѣ въ томъ успѣхъ: то надобно давать больному два дни съ ряду такія лѣкарства, которыя противнымъ своимъ духомъ кишки наполнить могутъ; а послѣ дать ему крѣпкое проносное.

И такъ долженъ больной принимать два дни чрезъ три часа по пяти гранъ лѣкарства называемаго (assa foetida).

На третей день долженъ онъ принять на щакъ проносной порошокъ, предписанной подъ числомъ 71, и запить оной тонкою похлебкою, которую и послѣ по частямъ принимать долженъ до тѣхъ поръ, покуда порошокъ дѣйствовать будетъ.


Если послѣ сего всѣ припадки не исчезнутъ: то по прошествіи осми дней тѣ же самыя лѣкарства повторить должно.

к о н е ц ъ.



THE UNITED STATES OF AMERICA
DO hereby certify that
[Name] is a citizen of the United States
and that he is a member of the
[Organization] and is entitled to
the benefits thereof.
[Signature]
[Title]
[Date]

ATTEST



Лѣкарства.

1.

Возми травъ опредѣ-
ленныхъ для грудного
взвару три унца, вари
въ довольномъ количествѣ
простой воды чрезъ пол-
часа, процѣди; и три фун-
та отдай для употре-
бленія.

2.

Возми составу приго-
товленнаго для сонныхъ
пилюль восемь гранъ, сдѣ-
лай изъ онаго двѣ пилюли,
и дай на одинъ приемъ.

3.

Возми травъ опредѣ-
ленныхъ для умягчите-
льнаго взвару шесть ун-
цовъ, вари въ доволь-
номъ количествѣ простой
воды пока сдѣлаются на
подобіе размазни, при о-
кончаніи прибавь толче-
ныхъ горчичныхъ сѣмянъ
одинъ унцъ, смѣшай и
сдѣлай густую припарку.

Medicamenta.

1

Rec: **S**pecier. decocti pec-
toral.

Unc. iij.

Bulliant in f. q. aq.
communis per $\frac{1}{2}$. horae,
colat. ℥. iij exhibe.

2.

Rec: Massae pilular. de
Cynoglossa.

gr. viij.

F. pil. No. ii.
pro dosi.

3.

Rec: Specierum decocti
emollientis

Unc. vj.

Bulliant. in f. q. aq.
communis ad spissitud. Ca-
taplasmatidis, sub finem ad-
dendo sem. Sinapis con-
tusor.

Unc. j.

m. F. cataplasma.

4.

Возми бузиновыхъ цвѣ-
товъ одинъ унцѣ, на-
лей довольнымъ количе-
ствомъ простой воды,
закрой сосудъ и поставь
на огонь, какъ скоро
только вскипитъ, сними
съ огня и оставь чрезъ
полчаса, чтобы насто-
ялася, послѣ процѣди и
въ трехъ фунтахъ ра-
спусти бузинового ки-
селя полтора унца; пе-
речищенной селитры со-
рокъ гранъ.

5.

Возми бузиновыхъ и
розовыхъ красныхъ цвѣ-
товъ по полуунца, пере-
чищенной селитры одинъ
золотникъ, смѣшай и
отдай для употребле-
нія вмѣсто чаю.

4.

Rec: Flor. Sambuc.
Unc. j.

Bulliant per momen-
tum in f. q. aq. com-
munis vase clauso, dein
digere fervide spatio $\frac{1}{2}$
horae, in colat. ℥. ii.
solve.

Rob. Sambuc.
Unc. j ℞

Nitri puri gr. x℥
m.

5.

Rec: Flor. Samb.
— Rosar. rubrar. an.
Unc ℞.

Nitri puri dr. j.
Misce.

Pugillum hujus infun-
datur aquae fervida instar
potus Theæ.

6.

Возми Александрій-скихъ листочковъ шесть золотниковъ, норичника водянаго двѣ драхмы, лиственничной бѣлой губки одну драхму, тамариндовъ полунца, изрѣжь все и смѣшай вмѣсто; дай кипѣть съ довольномъ количествомъ простой воды чрезъ четверть часа процѣди и къ двумъ унцамъ прибавь пригото-вленнаго изъ цихоріи (или солнцовой сестры) и ревеню сиропу полунца смѣшай и сдѣлай составъ на одинъ приемъ.

7.

Возми травъ опредѣленныхъ для умягчителнаго взвару четыре унца вари съ довольномъ количествомъ простой воды чрезъ полчаса, процѣди и дай три фунта.

8.

Возми оставшіяся послѣ упомянутаго взвару травы, прибавь муки изъ

6.

Rec: Fol. Senæ dr. vi.
— Scrophular. aquat.
dr. ij.
Agarici dr. j.
Tamarind. Unc. ℞.

Bulliant in f. q. aq. communis per $\frac{1}{4}$ horae, dein colat: Unc. ij.
adde

Syr. Cich. c. rheo
Unc. ℞.

M. F.

Haustus una vice sumendus.

7.

Rec: Specier. pro decocto emolliente

Unc. iv.
lecoque per $\frac{1}{2}$ horae, in f. q. aq. communis colat: ℞. iij. exhibe.

8.

Rec: Speciebus a priori decocto residuis adde



льняныхъ сѣмянъ два унца
льняного масла два унца,
и составь густую при-
парку.

Far. Semin. Lini.

Unc. ij.

Ol. Lini

Unc. ij.

ut fiat lege artis Cata-
plasma.

9.

Возми розовыхъ кра-
сныхъ цвѣтовъ двѣ ще-
поши, репью одну
горсть, смѣшай, налей
кипяткомъ такъ, какъ
чай наливаютъ, приба-
вивъ немножко меду, и
сдѣлай полосканье.

9.

Rec: Fl. rosar. rubr.

pug. ij.

Agrimoniae

man. j.

Misce.

Infundantur instar po-
tus Theae, pro gargarisma-
te, addito pauco melle.

10.

Возми розоваго меду
полунца, кислоты по-
варенной соли двадцать
капель, смѣшай.

10.

Rec: Mellis Rosar.

Unc. ℞

Spir. Salis marini

gutt. xx.

Misce.

11.

Возми травъ опре-
дѣленныхъ для умяг-
чительнаго взвару два
унца, дай кипѣть въ
довольномъ количествѣ
воды чрезъ полчаса,
процѣди и къ одному

11.

Rec: Specier. decocti
emollient. Unc. ij.

Bulliant in f. q. aq.
communis per $\frac{1}{2}$ horæ,
colat. ℞. j. adde

Oxym. simpl. Unc. ij.

Nitri puri dr. j.

фунту



фунту прибавь составу
изъ уксусу и меду два
унца, перечищенной сели-
стры одинъ золотникъ
смѣшай для промыва-
тельного.

12.

Возми травъ опредѣ-
ленныхъ для смягчитель-
наго взвару три унца,
вари въ довольномъ ко-
личествѣ простой воды,
процѣди и въ четырехъ
фунтахъ распустити Ве-
неціанскаго мыла два
унца для жидкой при-
парки.

13.

Возми перечищенной
селистры полтора золо-
тника, жерновокъ два
золотника, сиропу изъ
цвѣтовъ дикаго маку
(rheas) два унца, ячной
воды десять унцовъ,
смѣшай.

14.

Возми сладкаго миндаль-
наго масла, или вмѣсто

m.
pro clysmate.

12.

Rec: Specier. decocti
emollient. Unc. iij.
Bullant per horam in
f. q aq. communis, in
colat. ℥. iv. solve.

Saponis Veneti
Unc. ij.

Misce
pro fomento.

13.

Rec: Nitri puri
dr. j. ℞.
Lap cancr. præpar. dr. ij.
Syr. fl. rhead. Unc. ij.
Aqu. decoct. hordei
Unc. x.

m.

14.

Rec: Ol. Amygdal.
dulc. vel & ejus loco



онаго самаго чистаго
деревяннаго масла два
унца, лишной желтокъ
одинъ, чистаго меду о-
динъ унцъ, смѣшай, и
сопри въ иготи.

15.

Возми картузіанскаго
порошку три грана, жер-
новокъ двадцать гранъ
смѣшай и сдѣлай самой
мѣлкой порошокъ на о-
динъ приемъ.

16.

Возми Вероники, ре-
пейнику, будры, золо-
тушнику по равной ча-
сти, налей кипяткомъ
такъ, какъ обыкновенно
чай наливаютъ.

17.

Возми огурешныхъ
сѣмянъ полунца, облуп-
ленныхъ сладкихъ мин-
далей числомъ восемь,
горькихъ миндалей два,
сдѣлай съ однимъ фун-
томъ ячной воды мин-
дальное молоко, процѣди.

Ol. Olivar. purissim. **Unc. ij.**
Vitell. ovi No. j.
Bene simul subactis
Mellis puri **Unc. j.**
M. F. linctus.

15.

Rec: Kermes mineral.
gr. iij.
Lap. cancr: gr. xx.
M. F. pulv. tenuiss.
pro dosi.

16.

Rec: Veronicæ,
Agrimonix,
Hederæ terrestris,
Virgæ auræ an. part.
æqual.
Intendantur aqua fer-
vida instar potus Theæ.

17.

Rec: Sem. cucum.
Unc. ℥.
Amygd. exscort. dulc.
No. viij.
— — amar. No. ij.
Emulge l. a. cum
Aq. Hordei **℥. j.**
& colat. detur usui.



18.

Возьми смирны пиа:
надцать гранъ, жерновок
ползолотника, смѣшай и
сдѣлай порошокъ.

19.

Возьми составу при-
готовленнаго для сонныхъ
пилюль шесть гранъ
и сдѣлай двѣ пилюли

20.

Возьми бальсаму ко-
пайвы ползолотника
желтокъ яичной одинъ,
сопери хорошо въ сте-
кланой ступкѣ, потомъ
прибавь чистаго меда
одинъ унцъ, и ещ
смѣшай.

21.

Возьми бѣлокопытнику
или двоелистнику, ска-
біозы, или дьявольскаго
окушенія, верхушекъ зѣб-
робою по одной горсти,
стружекъ солодковаго
корня два унца, смѣшай
и отдай для употребле-
нія вмѣсто чаю.

18.

Rec : Myrh gr. xv.
Lap. sancr : dr. ß.
M. F. pulv.

19.

Rec : Massae pilul. de
Cynogloss. gr. vj
Fiant pilulae, No. ij

20.

Rec : Balf Copayb.
dr. ß.
Vitell. ovi No j.
Diu simul tritis in
Mortario vitreo adde
Mellis puri Unc, j.
Misce.

21.

Rec : Tussilag. Scabios.
Summit hyperic. ana
m. j.
Clycirrhiz. rasæ
Unc. ij.
Misce.
Infundantur instar po-
tus Theæ.



22.

Возми перечищенной
селистры одинъ золот-
никъ, жерновокъ два зо-
лотника, сиропу изъ
большаго проскурняка о-
динъ унцъ, ячной воды
десять унцовъ, смѣшай.

23.

Возми стружекъ дерева
называемаго сассафра-
сѣ два унца, бѣлаго, желтаго
и краснаго санталу по
два золотника, рѣза-
наго солодкового корня
одинъ унцъ, изрѣжь все
въ смѣсь и отдай для упо-
требления въ мѣсто чаю.

24.

Возми Сиденгамоваго
болѣзнь утѣляющаго со-
ставу пятнадцать ка-
пель, сиропу изъ мако-
выхъ головокъ полунца,
ячной воды одинъ унцъ,
смѣшай и отдай.

25.

Возми травъ опредѣ-
ленныхъ для противли-
жорадочнаго взвару три
унца, вари съ довольно-
мъ количествомъ простой

22.

Rec: Nitri puri dr. j.
Lap Cancr: dr. ij.
Syr alth. Unc. j.
decoct. Hordei Unc. x.
Misc.

23.

Rec: Lign. Sassafras
Unc. ij
— 3 Santal. an.
dr. ij.
Glycirhiz. rasæ
Unc j.
scissa mista exhibe
Infundatur instar po-
tus Theæ.

24.

Rec: Laud. liquid. Sy-
denham. gutt. xv.
Syr. diacod. Unc ℞
Aq. decoct. hord.
Unc. j.
M. F. haustus.

25.

Rec: Specier. pro de-
cocto antifebril:
Unc. iij.
Bulliant per $\frac{1}{2}$ horæ
vase clauso in f. q aq.
ВОДЫ

воды въ закрытомъ со-communis, dein colat,
судъ чрезъ полчаса, по-℥. iv. exhibe,
томъ процѣди четыре
фунта и отдай.

26.

Возми рвотнаго виннаго
камня пять гранъ, сдѣлай
порошокъ.

27.

Возми бразильскаго
рвотнаго корня ползоло
тника, сдѣлай порошокъ
и отдай.

28.

Возми Корнахиноваго
слабительнаго порошокъ
сорокъ гранъ, и отдай.

29.

Возми полихресто
вой соли два золоти
ника, окупоросеннаго вин
наго камня одинъ золо
тникъ, сиропу изъ пяти
корней отверзающихъ два
унца, ячной воды пол
фунта, воды перегонной
изъ цитронной корки два
унца, смѣшай.

30.

Возми Перуанской или
лихорадочной корки одинъ
унцъ, сдѣлай мѣлкимъ по
рошкомъ, и раздѣли на две
наддашь равныхъ частей.

26.

Rec: Tartari Emet.
gr. v.
F. Pulvis.

27.

Rec: Rad. Ypecacuanh.
dr. ℥.
F. Pulvis.

28.

Rec: Pulver. Cornachin.
gr. xl.

29.

Rec: Sal. Polychr.
dr. ij.
— Tartar. Vitriol.
dr. j.

Syr. s. rad. aper.
Unc. ij.

aq. decoct. hord ℥. ℥.

— Cort. Citri. Unc. ij.
m.

30.

Rec: Cort. Peruv.
Unc. j.

F. pulvis tenuis

Dividendus in xij.

doses æquales.



31.

Возми перевареннаго
и отъ пѣны очищеннаго
меду три фунта, вин-
наго, крѣпкаго уксусу
одинъ фунтъ и смѣшай

32.

Возми перечищеннаго
и въ хрустали сросшаго-
ся виннаго камня сорок
гранъ, полихрестовой
соли двадцать гранъ,
смѣшай и составь по
рошокъ на одинъ при-
емъ. Сему подобныхъ
сдѣлай столько, сколько
потребно будетъ.

33.

Возми четверосостав-
наго Териаку, полны
сахаромъ приправленнаго
по полтора унца, смѣ-
шай.

34.

Возми руфѣеваго со-
ставу для пилюль трид-
цать гранъ, сдѣлай семъ
пилюль.

35.

Возми составу изъ уксу-
су и меду сосквиллою два
унца, полихрестовой соли
два золотника, окупоро-
сеннаго виннаго камня,

31.

Rec: Mellis despumati
℥. iij.

Aceti Vini fragrantis
℥. i

m.

32.

Rec: Cryfall. ☐ gr. xl.

Sal. polychr. gr. xx.

M F. pulv.

Dentur plures tales
lofes prout opus erit.

33.

Rec: Theriac. Dai-
estlar.

Conserv. Absinth. an.
Unc. j. ℞.

Misce.

34.

Rec: Pill. ruff. gr. xxx.
F. Pill. viij.

35.

Rec: Oxym. Scillit.
Unc. ij.

Sal polychr. dr. ij.

— ☐ ⊕ dr. j.

Aq. communis

Unc. viij.
одинъ



одинъ золотникъ , про-
стой воды восемъ унцовъ,
мятной водки полунца ,
смѣшай.

36.

Возми соли поли-
хрестовой два золот-
ника , окупоросеннаго
виннаго камня одинъ зо-
лотникъ, четверосостав-
наго Оеріаку три унца,
сиропу изъ пяти отвер-
зающихъ корней, сколько
потребно, смѣшай и сдѣ-
лай кашку.

37.

Возми свѣжаго корня
лырею полфунта, травы
называемой попово гу-
менцо , или одуванчики
съ ея корнемъ вмѣстѣ че-
тыре унца, изрѣзавши и
столокши все вмѣстѣ вари
въ довольномъ количествѣ
простой воды, или лучше,
сыворожки, (если только
оную достать можно)
чрезъ полчаса, потомъ
процѣди, остатокъ крѣп-
ко выжми , къ двумъ
фунтамъ прибавь чистаго
меду три унца и отдай.

Sp. Menth. Unc. ℞.
m.

36.

Rec: Sal. Polychr.
dr. ij.

— — ☐ ⊕ dr. j.

Ther: diateff:

Unc. iij.

Syr. s. rad. aper. q. s. u. F.
electuarium.

37.

Rec: Rad: Recent
Graminis ℞. ℞.

— — Taraxaci cum
loto Unc. iv.

Scissa tusa bulliant in
f. q. aq. communis, vel
& feri Lactis, si commo-
de haberi poterit, per $\frac{1}{2}$
horæ, colaturæ fortiter ex-
pressæ ℞. ij adde

Mell. pur. Unc. iij.
Misce.

38.



38.

Возми верхушекъ простой полыни два унца, корня иря, корня генціаны, царскаго корня, по одному унцу, лавровыхъ ягодъ полтора унца, можжевельныхъ ягодъ три унца, смѣянь критской моркови одинъ унцъ, изрѣжь, изтолки, и смѣшавъ налей винограднаго хорошаго вина, или варенаго меду восемь фунтовъ, закрой сосудъ, поставь на супки въ умѣренной и равной теплотѣ, и потомъ употребляй.

39.

Возми свѣжей сквиллы полунца, налей хорошаго винограднаго вина два фунта.

40.

Возми камфоры одинъ золотникъ, миндальнаго масла одинъ унцъ смѣшай и сопри въ ступкѣ.

38.

Rec: Summit Absinth. vulgar. Unc. ij.

Rad. Calami aromat.

— Gentian.

— Imperator. an.

Unc. j.

Baccar. Lauri.

Unc. j. ℞.

— Juniper. Unc. iij.

Sem. Dauci cret.

Unc. j.

Scissa tusa mista infundantur calide vase clauso in Vini boni, vel & Hydromelitis.

℥. viij.

per 24. horas.

39.

Rec: Scillæ recent.

Unc. ℞.

Infundatur Vini boni.

℥. ij.

40.

Rec: Camphor. dr. j. Solvatur terendo in mortario in Unc. j. OL Amygdalarum dulc.



41.

Возми благовоннаго
аниснаго масла четьре
капли, чистаго и сухаго
сахару сорокъ гранъ, ре-
веню пѣнадцать гранъ
смѣшавъ, сдѣлай поро-
шокъ.

42.

Возми мятной воды
восемь унцовъ, мятной
водки полунца, смѣшай.

43.

Возми коришневой воды
одинъ унцъ, ячной воды
полфунта, чистаго опія
три грана, жерновокъ
полтора золотника, си-
ропу изъ бѣлаго маку по-
лунца, смѣшай.

44.

Возми отборнаго ре-
веню одинъ золотникъ,
желтыхъ миробалановъ
ползолотника, смѣшавъ,
сдѣлай порошокъ.

45.

Возми Венеціанскаго Ое-
ріаку одинъ золотникъ,
сдѣлай катышокъ.

41.

Rec: Ol. still. Ainsii
gutt. iv.
Sacchari puri sicci.
gr. xL.
Rhei grana xv.
M. F. pluv.

42.

Rec: Aq. still. Menth.
Unc. viij.
Sp. Menth. Unc. ℥.
m.

43.

Rec: Aq. still. Cinamomi
Unc. j.
— Hordei ℥. ℥.
Opii puri gr. iij.
Lap. cancr: dr. j. ℥.
Syr. Papav. alb.
Unc. ℥.
m.

44.

Rec: Rhei elect. dr. j.
Myrobalanor Citrinor.
dr. ℥.
M. F. pulv.

45.

Rec: Theriac. Androm.
dr. j.
F. bolus.



46.

Возми бразиліанскаго
рвотнаго корня сорокъ
грань, и сдѣлай изъ него
порошокъ.

47.

Возми одинъ грань
опія, сдѣлай пилюлю.

48.

Возми соединеннаго съ
воскомъ сурмянаго сте-
кла восемь грань, и изъ
него сдѣлай порошокъ.

49.

Возми Армянской земли
шесть золотниковъ, ка-
меди одинъ золотникъ,
Венеціанскаго Эсріаку
полпора унца, сиропу изъ
бѣлаго маку сколько по-
требно, сдѣлай кашку.

50.

Возми хорошаго ви-
нограднаго вина полфун-
та, ячной воды пол-
тора фунта, коришне-
вой воды одинъ унцъ,
чистаго сахару шесть
золотниковъ, смѣшай.

51.

Возми чистаго пер-
пентину два золотника

46.

Rec: Rad. Ypecacuanhæ
gr. xl.
F. pulvis.

47.

Rec: Opii crudi gr. j.
Fiat Pilula.

48.

Rec: Vitri Antimonii
cerati gr. viij.
F. pulvis.

49.

Rec: Boli Armenæ
dr. vj.
Gummi Arab. dr. j.
Theriac. androm.
Unc. j. B.
Syr. Pap alb q. s. u.
F. Electuar.

50.

Rec: Vini boni
Decocti Hordei ℥. B.
Aq. Cinnamomi ℥. j. B.
Unc j.
Sacchari puri dr. vj.
m.

51.

Rec: Terebinthi puræ
dr. ij.
личной



яичной желтокъ одинъ ,
смѣшай и сопри хорошо
вмѣстѣ, потомъ прибави
Венеціанскаго Оеріску по
лунца , свѣжаго молока
пять унцовъ , смѣшай ,
для промывательнаго.

52.

Возми опредѣлен-
ныхъ для умягчительнаго
взвару травъ два унца ;
дай кипѣть съ доволь-
нымъ количествомъ про-
стой воды полчаса, про-
цѣди и къ десяти ун-
цамъ прибавь льнянаго
масла два унца, смѣшай
для промывательнаго.

53.

Возми листовъ боль-
шаго. проскурняка двѣ
горсти , корня изъ той
же травы одинъ унцъ ,
шолченаго льнянаго сѣ-
мени два золотника ,
вари съ довольнымъ ко-
личествомъ простой во-
ды чрезъ полчаса , по-
томъ процѣди , и къ
шремъ фунтамъ прибавь
селистры чистой одинъ
золотникъ, частаго меду

Vitell. ovi No. i.
Diu simul tritis &
bene permistis adde
Theriac. Androm.
Unc. ℞.
Lactis puri recent.
Unc. v.
M. F. Clysma.

52.

Rec: Specier. decoct.
emoll. Unc. ij.
Bulliant in f. q. Aq.
communis per $\frac{1}{2}$ horæ,
colat. Unc. x adde
Ol. Lini Unc. ij.
M. F. Clysma.

53.

Rec: Fol Alth M. ij.
Rad. Alth. Unc. j.
Sem. Lini contus.
dr. ij.
Bulliant per $\frac{1}{2}$ horæ
in f. q. aq. communis.
colat. ℥. iiij.
adde
Nitri puri dr. j.
Mellis puri Unc. iiij.
m.

при.



три унца, смѣшай.

54.

Возми тамариндовъ
три унца, вари съ до-
вольнымъ количествомъ
простой воды чрезъ пол-
часа такъ, чтобъ вода
кипѣла, процѣди три
фунта, и прибавь къ
нимъ перечищенной се-
листры одинъ золотникъ,
меду два унца.

55.

Возми муки горчиш-
ныхъ сѣмянъ одинъ унцъ, ^{pis}
муки льняныхъ сѣмянъ
полшора унца, муки изъ
бобовъ одинъ унцъ, по-
варенной соли два зо-
лотника, уксусу, сколько
потребно, сдѣлай тѣсто,
которое къ подошвамъ
приложить должно.

56

Возми бѣлаго купоросу
одинъ золотникъ, про-
стой воды одинъ унцъ,
смѣшай.

54.

Rec: Tamarindor.

Unc. iij.

Bulliant in f. q. aq.
communis $\frac{1}{4}$. horæ, colat.

℥. iij. adde

Nitri puri.

dr. j.

Mellis

Unc. ij.

MB.

55.

Rec: Farin. Sem Sinap

Unc. j.

— Lini Unc. j. ℞.

— Fabar. Unc. j.

Salis commun. dr. ij.

Aceti q. f. u. F. pasta
pedum plantis appli-
canda.

56.

Rec: Vitriol albi dr. j.

Aq. commun. Unc. j.

Misce.

57.

Возми лиственничной
бѣлой губки, въ порошокъ
стертой, сколько по-
требно.

58.

Возми Венеціанскаго
Ѳеріаку одинъ золот-
никъ, летучей соли оле-
ньяго рогу десять гранъ,
смѣшай и сдѣлай кашы-
шекъ.

59.

Возми свѣжаго молока
два фунта, бѣлаго Ав-
стрійскаго вина четыре
унца, пусть покипятъ
чрезъ минуту, потомъ
сыръ отдѣли, а сыворо-
тку чистую отдай.

60.

Возми Виргинскаго
змѣинаго корня, и корня
контраервы по десяти
гранъ, Перуанской лихо-
радошной корки ползо-
лотника, камфоры че-
тыре грана, смѣшай и
сдѣлай порошокъ.

61.

Возми камфоры (драхму)
одинъ золотникъ, три
въ стекляной ступкѣ,
прибавляя дванцать ка-

57.

Rec: Agarici pedis
equini figura pulverisati
quantum sufficit.

58.

Rec: Theriac. Andro-
mach. dr. j.
Sal. Corn. Cervi
gr. x.
M. F. Bolus.

59.

Rec: Lactis dulcis re-
cent. ℥. ij.
Vini Austriaci albi
Unc. iv.
Bulliant simul per
momentum, dein colostro
lactis percolatur: sepa-
rato, serum purum ex-
hibe.

60.

Rec: Rad. Serpent.
Virgin.
Rad. contrayerv. an
gr. x.
Cort. Peruv. dr. ℞.
Camphor. gr. iv.
M. F. pulv.

61.

Rec: Camphoræ dr. j.
Teratur in Mortario
vitreo, addendo gut-

):():(

пель

пель самага крѣпкаго вин-
наго спирту, потомъ
прибавь чистаго и сухаго
сахару два унца, долго
вмѣстѣ три, наконецъ
прилей виннаго крѣпкаго
уксусу десять унцовъ,
смѣшай, влей въ чистой
стекляной сосудъ, затк-
ни и сохрани до упо-
требленія.

62.

Возми свѣжаго на по-
нинькіе кусочки разрѣзан-
наго хрѣну четыре унца,
свѣжихъ листовъ ложеч-
ной травы, листовъ
вахты по двѣ горсти,
лисовъ шалфея одну
горсть, изрѣжь, смѣшай,
налей бѣлаго Австрій-
скаго вина шесть фун-
товъ, заткни сосудъ, о-
ставь въ умѣренномъ жару
чрезъ сутки, потомъ
процѣди и отдай.

63.

Возми корня конскаго
щавля, малаго солодкова-
го корня по полунца, пе-
речищеннаго и въ хру-

tulas viginti Spirit. Vi-
ni rectificati, dein adde
Sachari puri sicci
Unc. ij.
diu simul tritis misce
Aceti Vini fragantis
Unc. x.
Misce.
Servetur in vase vi-
treo puro bene clauso.

62.

Rec: Radic. Raphan.
rustic. recent. in minu-
tas taleolas confissi
Unc. iv.
Fol. recent. Cochle-
ariæ
— Trifol. æquat.
an. m. ij.
— Salviæ m. j.
Scissa mista infunde
vase clauso Vini albi Austri-
aci ℥. vj. digere leni
calore per 24. horas,
& colat.
exhibe.

63.

Rec: Rad. Lapathi
acuti
— Polypod. querni
an. Unc. β.
стали



стали сросп. шагося вин-
наго камня при золотни-
ка, вари чрезъ полчаса въ
трехъ фунтахъ свѣжаго
молока, процѣдивши при-
бавь чистаго меду пол-
тора унца.

64.

Возми водки ложечной
травы два унца, Пара-
дельсоваго Элексиру о-
динъ унцъ, смѣшай.

65.

Возми кислоты по-
варенной соли одинъ зо-
лотникъ, розоваго меду
полтора унца, простой
воды пять унцовъ, смѣ-
шай.

66.

Возми сулемы две-
нащатъ гранъ, простаго
хлѣбнаго вина два фун-
та, смѣшай въ стекла-
номъ сосудѣ ускогор-
ломъ, заткни сосудъ и
оставь пока сулема сама
собою разпустится.

Cristall. Tartar.

dr. iij

Decoque per $\frac{1}{2}$ ho-
in lb. iij. lactis dul-
recentis, colat. adde
Mellis puriss.

Unc. j β .

m.

64.

Rec: Sp. Cochlear.

Unc. ij.

Elix propriet. Para-
celf.

Unc. j.

m.

65.

Rec: Sp. Salis Marini

dr. j.

Mell. Rosar.

Unc. j. β .

Aq. communis

Unc. v.

m.

66.

Rec: Mercurii subli-
mati corrosivi

gran. xij.

Spir. frumenti semel
rectificati lb. ij.

In Phiala vitrea pu-
ara clausa ferventur, do-
nec Mercur. sublim. sponte
solvatur.



67.

Возми корня большого
проскурняка два унца,
вари кипеткомъ въ доволь-
номъ количествѣ про-
стой воды чрезъ часъ, на
конецъ прибавь рѣзаного
солодковаго корня одинъ
унцъ, процѣди четыре
фунта и отдай.

68.

Возми скаммоніи пять-
наццать гранъ, чистаго
сахару десять гранъ, сѣр-
нортушнаго Еѳіопа дват-
цать гранъ, потовой
сурьмы дватцать гранъ,
изопри все вмѣстѣ въ
порошокъ.

69.

Возми сѣрныхъ цвѣтовъ
триццать гранъ, сѣр-
нортушнаго Еѳіопа де-
сять гранъ, смѣшай и
сдѣлай порошокъ. Сему
подобныхъ дватцать о-
динъ отпусти.

70.

Возми сѣрнортушнаго
Еѳіопа одинъ унцъ, сви-

67.

Rec: Rad. Althææ
Unc. ij.
Buillant in f. q. Aq.
communis per horam, sub
finem addendo
Glycirhiz. rasæ
Unc. j.
colat. ℥. iv. exhibe.

68.

Rec: Scammon. gr. xv
Sacchari puri gr. x.
Æthiop. mineral. gr. xx.
Stib. Diaphoret. gr. xx.
M. F. Pulv.

69.

Rec: Flor. Sulphuris gr. xxx.
Æthiopis mineral. gr. x.
M. F. Pulv.
dentur. tales doses
n. xvj

70.

Rec: Æthiop. mineral.
Unc. j.
наго



наго жиру три унца,
смѣшай и сдѣлай мазь.

71.

Возми минеральнаго
турпенту пять гранъ,
корня ялаппы сорокъ
гранъ, чистаго сухаго
сахару дватцать гранъ,
смѣшай и сотри въ по-
рошокъ въ стеклянной
ступкѣ.

Axungia porcina.
Unc. iij.
M. fiat Unguent.

71.

Rec: Turbith. miner.
gr. v.
Rad. Jalapp.
gr. xl.
Sacchari puri siccif-
simi
gr. xx.
M. fiat Pulvis tenuiss
in Mortario vitreo.

